

## NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

Recopilado por Blas MOLINA, Rubén MORENO-OPO y Juan Antonio LORENZO (Canarias)

### Colimbo Grande

*Gavia immer*

Dos individuos (un adulto y un joven) en el embalse de Ullibarri-Gamboa, Álava, entre el 12 de febrero y el 2 de marzo de 2004 (J. A. Gainzarain).

### Pardela Chica

*Puffinus assimilis*

**Canarias.** En la isla de La Palma, donde se considera nidificante probable, el 17 de mayo de 2004 se recoge un juvenil deslumbrado en el muelle de Santa Cruz de La Palma, que se libera con posterioridad (R. Pedrianes).

### Cormorán Grande

*Phalacrocorax carbo*

Intento de cría en la Albufera de Adra tras la instalación de una piscifactoría en las proximidades, con inicio de pautas nupciales y construcción de nido sobre vegetación palustre con un total de 70 ejemplares y hasta 20 nidos, desde el 14 de enero al 18 de marzo de 2004. En abril los ejemplares acaban por abandonar la colonia, posiblemente debido a las medidas antipredatorias establecidas en la piscifactoría (M. Paracuellos y J. C. Nevado). Reproducción en el embalse de Bornos, Cádiz, en 2004. Se trata del punto más meridional de cría para la especie y además con cría tardía entre mediados de julio y mediados de octubre: el 20 de julio se encuentra un nido con un ave incubando en un eucalipto seco; el 14 de agosto se observan dos nidos, uno con dos pollos de mediana edad que son cebados y otro con un ave incubando; el 16 de septiembre, el primer nido tiene dos pollos a punto de volar y el segundo con un pollo de corta edad; finalmente, el 5 de octubre vuelan los dos pollos del primer nido y el del segundo nido está a punto de volar (F. Chiclana, J. Garzón y V. M. Guimera). En un censo realizado desde canoa en el embalse de Rosarito (Toledo-Ávila) el día 24 de julio de 2004 se contabilizaron 76 nidos, si bien muchos de ellos se encontraban vacíos, posiblemente por las fechas, había algunos nidos con pollos de distintos tamaños. La colonia está repartida en 18 eucaliptos (J. L. de la Cruz, M. A. de la Cruz y Ó. FRÍAS/ARDEIDAS). Esta colonia se detectó por primera vez en 1999 aunque no se censó (L. S. Cano), en la temporada de cría 2002 se contabilizaron al menos 28 nidos y en 2003 se observaron más de 40 nidos ocupados (L. S. Cano, D. Langlois, J. Calle y J. Garzón/GOCE). Por el contrario, se reduce la cercana colonia del embalse de Navalcán, Toledo, a 13 nidos durante la primavera de 2004 (J. L. de la Cruz y M. A. de la Cruz/ARDEIDAS).

### Avetoro Común

*Botaurus stellaris*

Se encuentran restos de cráneo y plumas de un ejemplar en las charcas de Villalba de Duero, Burgos, en febrero de 2003 (J. Moneo, P. Sanz Trillo y F. J. Fernández). Un ejemplar en las Salinas de Bonanza, Cádiz, el 9 de julio de 2004 (F. Chiclana y R. Martín-Baylo). Se localizan 10 machos y cuatro nidos en la temporada de reproducción de 2004 en el Parque Nacional de Doñana: el 6 de abril se encuentra un nido con tres huevos y otro en construcción, ambos con la presencia de la hembra; en un segundo



**Cormorán Grande** *Phalacrocorax carbo*. El embalse de Rosarito, Toledo-Ávila, constituye la localidad de cría más importante con 76 nidos en la temporada 2004. Foto: M. A. de la Cruz/ARDEIDAS.

control se comprueba que las garzas imperiales los han utilizado para construir su nido encima y debajo se encuentran los huevos rotos. El 11 de mayo se localiza otro nido con cuatro huevos que fue depredado por un jabalí. El 28 de mayo se halla un cuarto nido con un huevo, si bien en un control posterior se comprueba que se ha malogrado y se detecta resto de ese huevo y otros cinco más en el agua debajo del nido, probablemente por influencia de la Garza Imperial y el Calamón Común (J. M. Espinar y F. Ibáñez).

### **Avetorillo Común**

#### *Ixobrychus minutus*

Cita invernal: un juvenil en la desembocadura del río Aljucén, Mérida, Badajoz, el 23 de noviembre de 2003 (F. Prieto).

### **Martinete Común**

#### *Nycticorax nycticorax*

Prosigue su aumento como reproductor en el País Vasco: 84 parejas en la colonia del Prao de la Paul, Álava, en la temporada 2003 y 154 parejas en la de 2004 (A. Onrubia).

### **Garcilla Cangrejera**

#### *Ardeola ralloides*

Un individuo en paso postnupcial en el río Jándula, Andújar, Jaén, el 24 de septiembre de 2003 (M. A. Díaz Portero). Un ejemplar en la laguna Larga de Villacañas, Toledo, el 26 de abril de 2004 (J. D. Acevedo y A. López López). Segunda cita para La Rioja: tres aves a orillas del río Ebro a su paso por Logroño el 28 de abril de 2004 (J. Serradilla, G. Garcandía, P. M. López y L. Rodríguez). Un juvenil en el río Aljucén, Mérida, Badajoz el 7 de julio de 2004 y en el mismo lugar un juvenil y dos adultos el 15 de julio (F. Prieto). Cuatro jóvenes voladeros pertenecientes a 1-2 nidos que se encuentran en la colonia de Garcilla Bueyera en la laguna de Pedro Muñoz, Ciudad Real, el 11 de agosto de 2004 (J. M. López Agúndez, M. C. López Agúndez, A. Iparraguirre y P. Vergara).

### **Garcilla Bueyera**

#### *Bubulcus ibis*

Se censan 33 parejas reproductoras en la Balsa del Prao de La Paul, Laguardia, Álava, durante la temporada 2003 (A. Onrubia). Dormidero invernal: se estiman unos 2.000 individuos en el soto del Arroyo Concejo en Cáceres, el 10 de enero de 2004 (M. Cardalliaguet). Fecha temprana de reproducción: adultos incubando en unos 150 nidos de una colonia tradicional situada en el río Guadiana, Mérida, Badajoz, el 2 de febrero de 2004 (F. Prieto). Colonia de unas 200 parejas sobre taras a orillas de la laguna de Pedro Muñoz, Ciudad Real, el 11 de agosto de 2004 (M. C. López Agúndez, J. M. López Agúndez, A. Iparraguirre y P. Vergara). Unos 30 nidos sobre ca-

rrizo en la laguna de Manjavacas, Cuenca, el 5 de septiembre de 2004. En algunos de ellos había todavía ejemplares jóvenes (J. M. López Agúndez y P. Vergara).

### **Garceta Grande**

#### *Egretta alba*

Observaciones en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora: tres individuos el 15 de noviembre de 2003 (J. A. Casado); uno en las lagunas de Barillos y La Rosa, los días 15 y 16 de noviembre, 6 de diciembre de 2003 y el 5 de enero de 2004 (J. A. Hernández y M. I. Martín Rodrigo); otro el 17 de enero de 2004 (M. Villaécija, M. Martín, F. Chiclana y SEO-Sevilla); y, finalmente, un individuo en plumaje nupcial junto a 16 espátulas comunes en la Salina de Barillos, el 29 de marzo de 2004 (T. Sanz, M. Postigo, S. Bayon, A. M. Álvarez y A. Espadas). Numerosas citas en Extremadura, todas de ejemplares aislados: en Badajoz, en el embalse de los Canchales, Mérida, el 23 y 30 de agosto, el 24 de septiembre y el 2 de noviembre de 2003 (F. Prieto), en el río Guadiana, Mérida, el 2 de noviembre de 2003 (J. A. Román) y en una zona pantanosa junto al río Zújar, al norte de la localidad de Campanario, el 24 de junio de 2004 (S. Preddy & M. Hall); en Cáceres, en la laguna de Casas de Hito, cerca de Vegas Altas, el 16 de octubre de 2003 (A. López López), en el embalse de Arrocampo, Almaraz-Saucedilla, el 29 de octubre de 2003 (A. López López), el 17 de enero de 2004 (Grupo Ornitológico Cacerense/GOCE) y el 10 de marzo de 2004 (J. Muddeman), en el embalse de la Jarilla, el 27 de diciembre de 2003 (J. Briz) y el 8 de enero de 2004 (J. Prieta), en la charca de Fresnedilla, Oliva de Plasencia, el 7 de marzo de 2004 (J. Muddeman) y en el embalse del Tozo, Torrecillas de la Tiesa, el 18 de abril de 2004 (J. Muddeman). Además, un grupo de 16 aves en Casatejada, Cáceres; la primera observación tiene lugar el 8 de febrero de 2004, el día 14 se observan 12 aves y el día 18 se alcanza la cifra máxima (J. Briz y V. Risco). Además, un grupo de 16 aves en Casatejada, Cáceres, el 18 de febrero de 2004. Los primeros ejemplares se avistaron el día 8 y el día 14 ya se contabilizaron 12 (J. Briz y V. Risco). Otras observaciones de un solo ejemplar en las colas meridionales del embalse de Ullibarri-Gamboa, Álava, entre el 20 y 27 de abril de 2003 (T. Andrés y A. Onrubia) y el 13 y el 19 de marzo de 2004 (A. Onrubia, J. Gómez, A. Unanue e I. de la Era); entre la isla del Pan y la isla de las Yeguas, P. N. de las Tablas de Daimiel, Ciudad Real, el 8 de agosto de 2003 (M. A. Díaz-Portero/SEO-Jaén).

Avistamientos de más de un individuo: tres en el Caño del Guadamar, Sevilla, el 7 de abril de 2004 (F. Chiclana); dos en la laguna de Pitillas, Navarra, el 4 de mayo de 2004 (J. M. Lekuona y A. Artázcoz) y cuatro en las Salinas de los Portugueses, Cádiz, el 30 de septiembre de 2004 (F. Chiclana, M. Martín y R. Martín-Baylo).

Datos de reproducción: una pareja con un nido con tres huevos en una colonia de Garza Imperial en Juncabalejos, marisma de las Nuevas, Parque Nacional de Doñana, Huelva, el 8 de junio de 2004; nido construido con tallos de carrizo seco y más elaborado que el de la garza, pero 20 días después se comprueba que la puesta se ha malogrado (J. M. Espinar y F. Ibáñez).

### Garza Real

*Ardea cinerea*

Continúa el aumento de la población nidificante en el País Vasco. Durante el 2003 se censaron en Álava 88 parejas: 52 parejas en la Balsa del Prao de la Paul, Laguardia, dos en el embalse de Ullibarri-Gamboa, tres en el humedal de Salburúa y 31 en Mártioda (A. Onrubia y T. Andrés). Se constata la reproducción de la especie dentro de la colonia de Garcilla Bueyera de la ciudad de Toledo: en abril de 2003 se detectan tres nidos, pero no se pueden confirmar que saquen pollos. En 2004 se vuelven a localizar tres nidos en la misma zona. El 1 de mayo se observa un nido con adulto y dos pollos y en otro de los nidos un adulto echado (J. M. López Agúndez, M. C. López Agúndez y P. Vergara).

### Garza Imperial

*Ardea purpurea*

Prosigue su asentamiento como reproductor en el País Vasco. En el año 2003 se censaron en Álava cuatro parejas: una en la Balsa del Prao de la Paul, Laguardia, y tres parejas en las colas meridionales del embalse de Ullibarri-Gamboa (A. Onrubia y T. Andrés).

### Cigüeña Negra

*Ciconia nigra*

Un ave juvenil en paso migratorio en el estuario del río Anllóns, Ponteceso, A Coruña, el 24 de septiembre de 1999 (X. Varela y M. Canedo). Bando de 130 ejemplares en migración en Los Barrios, Cádiz, el 20 de septiembre de 2002 (D. Berral). Invernada de ejemplares solitarios en una charca de Oliva de Plasencia, Cáceres, el 21 de diciembre de 2001 y entre el 14 de noviembre y el 27 de diciembre de 2002, y en el embalse de La Jarilla, Cáceres, el 15 de noviembre 2002 (J. Prieta, A. Goerst y A. Ventanas). Censo de invernada de la especie en Extremadura en el mes de noviembre de 2003: 51 ejemplares, 50 en la cuenca del Guadiana y uno en la cuenca del Tajo (L. S. Cano y 17 colaboradores). Una pareja realiza una puesta de reposición muy tardía en un nido situado en la ZEPA Cañones del Duero, Zamora, durante la temporada de cría de 2004. De la puesta de tres huevos nacieron dos pollos entre el 18 y 21 de junio. Uno de ellos murió y el otro voló entre el 3 y 6 de septiembre (M. Rodríguez Alonso y J. Palacios).

### Cigüeña Blanca

*Ciconia ciconia*

Se observa en una colonia tradicional en un cortado fluvial del río Alagón, Zarza la Mayor, Cáceres, el 11 de abril de 2004 que ha sido parcialmente usurpada por buitres leonados (J. Prieta). Cópula tardía: una pareja copulando en el nido en el acueducto de los Milagros, Mérida, Badajoz, el 29 de julio de 2004 (F. Prieto).

### Jabirú Africano

*Ephippiorhynchus senegalensis*

Observaciones de un ejemplar adulto de origen desconocido en Sevilla en el año 2003, aunque probablemente procedente de un escape: en el río Guadamar, a la altura del cortijo ribereño de la Pizana, Gerena, el 29 de mayo (P. Serveto); en Veta la Palma, el 8 de septiembre (A. Barragán); en el río Guadamar, Sanlúcar la Mayor, el 20 de septiembre (C. Hernández), el 30 de septiembre (J. M. Reyes/SEO-Sevilla); y el 6 de octubre (D. L. Huertas); en los arrozales de Alfonso XIII, Isla Mayor, a unos 2 km de la Venta del Cruce, el 26 de diciembre de 2003 (P. Chiclana y J. Garzón); y, finalmente, en el Brazo del Este, el 15 enero de 2004 (J. L. Arroyo).



**Jabirú Africano** *Ephippiorhynchus senegalensis*. Río Guadamar, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, septiembre de 2003. Foto: J. M. Reyes.

**Morito Común***Plegadis falcinellus*

En la provincia de Almería, uno en la Cañada de las Norias, el 16 de abril de 2003 y dos ejemplares en el Saladar de los Canos, el 16 de abril de 2004 (M. Paracuellos). Un adulto en la Rambla de Moreras, Mazarrón, Murcia, el 8, 12, 14 y 18 de abril de 2004 (J. Sánchez Balibrea, L. Aznar, A. J. Hernández Navarro y A. Fernández-Caro/ANSE). Dos individuos en el Marjal de Almenara, Castellón, el 9 de abril de 2004 (D. Olmos).

Citas en la laguna de Manjavacas, Cuenca, en 2004: tres aves el 11 de agosto (A. Iparraguirre, M. C. López Agúndez, J. M. López Agúndez y P. Vergara), cuatro el 5 de septiembre (J. M. López Agúndez y P. Vergara), dos individuos el 10 de septiembre (M. Santos y M. Romero/SEO-Sevilla) y ocho el 22 de septiembre de 2004 (M. Romero/SEO-Sevilla).

Posiblemente la mayor concentración registrada hasta el momento: se contaron un total de 3.025 moritos comiendo en arrozales en Isla Menor, Sevilla, el 9 de octubre de 2004 (J. Garzón).

**Espátula Común***Platalea leucorodia*

Dos ejemplares con librea de adulto en la Salina Grande de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora, el 5 de julio de 2003 (J. A. Hernández y M. I. Martín Rodrigo). Posiblemente la mayor concentración de aves en migración por el interior peninsular: 143 ejemplares en el embalse de los Canchales, Badajoz, el 18 de septiembre de 2003 (F. Prieto). Dos aves en la charca de Lancho, Malpartida de Cáceres, el 20 de enero de 2004 (S. Villa). Cuatro individuos en la laguna de Galisteo, Cáceres, el 16 de abril de 2004 (J. Prieta). Al menos una pareja en la zona tradicional de cría del noroeste de Cáceres, el 28 de abril de 2004 (J. Prieta).

Reproducción sin llegar a término en 2004 en el embalse de los Canchales, Mérida, Badajoz: se observan cópulas y construcción de nido de dos parejas en una colonia de Garza Real ubicada en encina; finalmente en junio abandonan sin sacar pollos (F. Prieto).

**Flamenco Común***Phoenicopterus roseus*

Uno en la laguna de Baldaio, Carballo, A Coruña, el 16 de junio de 2001 (X. Varela). Un juvenil alimentándose en el embalse de Santillana, Manzanares El Real, Madrid, el 2 de septiembre de 2002 (G. Martín). Unos 1.700 ejemplares en las lagunas de El Puerto de Santa María, Cádiz, el 30 de julio de 2003 (D. Berral). Un adulto en las charcas del Retamar, Torremejías, Badajoz, durante los días 24, 26 y 31 de noviembre de 2003 (F. Prieto).

**Cisne Vulgar***Cygnus olor*

Un ave en las Marismas Blancas, Astilleros, Cantabria, el 30 de marzo de 2003. Posiblemente sea procedente de ejemplares liberados (M. T. Garrigós y J. M. Pérez de Ana).

**Ánsar Campestre***Anser fabalis*

Desde que se publicó la desaparición de la última población invernante en España en el embalse de Ricobayo del Esla todos los años se habían observado algunos ejemplares aislados entre los bandos de ánsares comunes en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila. Sin embargo, en su zona tradicional de invernada, en el embalse de Ricobayo, la especie no se había vuelto a ver hasta que en el año 2003 se avistaron tres ejemplares el 15 de enero (M. A. García Matllanes) y el 16 de enero (M. García Roncero y A. Martínez Barrigós), y seis aves en Castropepe, Zamora, el 8 de diciembre de 2003 (J. A. Casado). Durante el invierno 2003-2004 se han observado siete individuos en esta zona tradicional entre el 15 de diciembre de 2003 y el 18 de febrero de 2004 (M. Rodríguez Alonso y J. Palacios).

**Ánsar Careto***Anser albifrons*

Un juvenil en el embalse de Portaje, Torrejuncillo, Cáceres, el 7 de febrero de 2002. En esta localidad se observaron tres individuos en enero de 2002 (J. Prieta). Tres individuos en la cola meridional del embalse de Ullibarrí-Gamboa, Álava, el 25 de enero de 2003 (T. Andrés y A. Onrubia). Un ave en las Marismas de Santoña, Cantabria, el 26 de enero de 2003 (M. Rouco). Diez ejemplares, la mayoría adultos, entre Villerías y Boada de Campos, Palencia, el 21 de diciembre de 2003 (A. López López).

**Ánsar Común***Anser anser*

Unos mil ejemplares en el embalse de Rosarito, Toledo, el 20 de enero de 2004 (D. Langlois).

**Barnacla Cariblanca***Branta leucopsis*

Un ave observada en la laguna de Boada de Campos, Palencia, el 21 de diciembre de 2003 (A. López López).

**Tarro Canelo***Tadorna ferruginea*

Un ejemplar en el Caño del Guadiamar, Sevilla, el 2 de enero de 2003 (F. Chiclana). Dos hembras en Isla Canosa-Estuario del Miño, A Guarda, Pontevedra, el 19 de enero de 2003 (L. E. Senra). Una hem-

bra adulta en la Marisma de Hinojos, Sevilla, el 6 y el 24 de febrero de 2003 (J. Butler). Un individuo en la charca de Fresnedillas, Oliva de Plasencia, Cáceres, el 6 de marzo de 2004 (M. Arcas). Un ejemplar en el Caño del Guadiamar, Sevilla, el 7 de abril de 2004 (F. Chiclana). Una pareja con once pollos en el río Aulencia, Madrid, a principios de mayo de 2004. La pareja se venía observando desde hace dos años y la hembra presentaba una anilla no oficial por lo que corresponden a ejemplares escapados de cautividad (J. Rodríguez-Osorio).

### Tarro Blanco

#### *Tadorna tadorna*

Grupo de 13 individuos en el embalse de Sierra Brava, Zorita, Cáceres, el 19 de enero de 2002 (Grupo Ornitológico Cacereño/GOCE). Observación de varias hembras de la especie, en concreto cuatro, tres y uno, en Galisteo, Cáceres, el 20 de diciembre, 20 de febrero y el 16 de marzo de 2003, respectivamente (J. Prieta). Dos individuos en el embalse de Valdecañas, Bohonal de Ibor, Cáceres, el 8 de abril de 2004 (D. Langlois y P. Guisado). En la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora, un macho y una hembra en época de cría los días 11, 13 y 18 de mayo, 5 y 6 de julio de 2003 (J. A. Hernández y M. I. Martín Rodrigo) y dos parejas crían durante la temporada 2004, una saca 9 pollos y la otra fracasa (Personal de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila).

### Ánade Friso

#### *Anas strepera*

Primeros datos de nidificación para la Cañada de las Norias, Almería: dos parejas con 7 y 9 pollos el 17 de junio y 15 de julio de 2002, respectivamente, y una pareja con 7 pollos, el 29 de mayo de 2003 (M. Paracuellos).

### Cuchara Común

#### *Anas clypeata*

Nidificación de una pareja que saca dos pollos en la Albufera de Adra, Almería, el 17 de junio de 2002 (M. Paracuellos). Una hembra con ocho o nueve pollos en el embalse del Tozo, Torrecillas de la Tiesa, Cáceres, el 21 de abril de 2004 (J. Muddeman).

### Cerceta Pardilla

#### *Marmaronetta angustirostris*

Datos de cría en Almería: en las Salinas de Cerrillos se registran los primeros datos de nidificación, un adulto con nueve pollos el 16 de julio de 2002 y otro con 10 pollos el 22 y 23 de julio de 2003 (M. Paracuellos y J. C. Nevado). Durante la temporada 2004 se reproduce espectacularmente la especie en esta provincia: se anotan cinco polladas y un total de 54 pollos en los Charcones de Punta Entinas-Sabinar desde el 24 de junio al 21 de julio. En fechas posteriores se siguen observando individuos, pero en número progresivamente decreciente (M. Paracuellos,

C. Raya y J. C. Nevado). Otras citas para la provincia: dos ejemplares en la desembocadura de las Salinas de Cabo de Gata y probablemente los mismos ejemplares en la Rambla de Morales, el 9 de abril de 2001, uno en la Albufera de Adra, el 15 de julio de 2002, 14 individuos en la Cañada de las Norias, el 26 de agosto de 2003, uno en la desembocadura de la Rambla de Morales el 28 de agosto de 2003 y 13 aves en la Cañada de las Norias, el 9 de septiembre de 2003 (M. Paracuellos).

### Porrón Pardo

#### *Aythya nyroca*

Citas en Almería: una hembra en la Cañada de las Norias, el 11 de abril de 2001; otra en las Salinas de Cerrillos, el 24 de mayo de 2001; un macho adulto en la desembocadura del río Almanzora, el 20 de diciembre de 2002; un ejemplar en las Salinas de Cerrillos, el 12 de noviembre de 2003; y de nuevo en la Cañada de las Norias un macho adulto, el 18 de diciembre de 2003 y una hembra el 21 de abril de 2004 (M. Paracuellos). Cinco individuos en el embalse de Rosarito, Toledo, el 29 de enero de 2004 (D. Langlois). Un macho en el embalse de Vicario, Peralvillo, Ciudad Real, el 1 de marzo de 2004 (A. López López).

### Porrón Moñudo

#### *Aythya fuligula*

Durante la temporada de cría 2004 se estiman cuatro parejas reproductoras en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora. En la temporada de cría de 1998 se alcanzó el máximo con diez parejas (Personal de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila).

### Pato Havelda

#### *Clangula hyemalis*

En Almería, un macho joven en las Salinas de Cabo de Gata, el 19 de diciembre del 2002, que acabó por verse en la desembocadura de la Rambla de Morales, y un macho joven en esta última localidad desde el 13 de enero hasta el 7 de abril de 2003 (M. Paracuellos).

### Porrón Osculado

#### *Bucephala clangula*

Una hembra adulta en una charca arenosa abandonada y naturalizada en el municipio de Sandiás, A Limia, Ourense, el 8 de mayo de 2004 (S. González y A. Villarino). Un macho adulto con plumaje de transición al de eclipse en la desembocadura de la Rambla de Morales, Almería, el 9 y 10 de junio de 2004 (M. Paracuellos y J. P. Enciso).

### Malvasía Cabeciblanca

#### *Oxyura leucocephala*

Más de 400 individuos en la laguna de Manjavacas, Cuenca, el 22 de septiembre de 2004 (M. Romero/SEO-Sevilla).

**Elanio Común***Elanus caeruleus*

En Zamora, un individuo en Milles de la Polvorosa, el 4 de agosto de 2003 y otro en La Tabla, Puente Quintos, el 14 de marzo de 2003 (J. A. Casado). Un ejemplar en Bustillo del Páramo, Palencia, el 1 de enero de 2004 (J. Echegaray y A. Hernando). Uno en las cercanías del Monte de San Antón, ciudad de Málaga, el 30 de enero de 2004. La reproducción de la especie en la provincia sólo se ha producido en una zona relativamente cercana (A. R. Muñoz).

**Milano Real***Milvus milvus*

Se localizan tres dormideros de la especie en el tramo final de río Jerte en diciembre de 2002 que suman al menos 300 ejemplares, el mayor de ellos con 147 aves se localiza en Galisteo, Cáceres (J. Prieta). Dormidero destacado de 400 ejemplares en Torrecillas de la Tiesa, Cáceres, durante el invierno 2003-2004 (A. Ortega). Un individuo en las inmediaciones de una granja de cerdos en Sierra de Yeguas, Málaga, el 9 de enero de 2004 (A. R. Muñoz).

**Alimoche Común***Neophron percnopterus*

Una pareja instala un nido en el suelo a unos 100 m de una cancilla de ovejas con mastines situada en el municipio de Fonfría, Zamora, durante la temporada 2003. Finalmente la pareja no logró sacar ningún pollo y los huevos se recogieron por el personal de la Junta de Castilla y León para su análisis (M. Rodríguez Alonso y J. Palacios). Un adulto en el Cañón del río Bibei (Ourense) el 20 de mayo de 2004 (J. Domínguez, J. V. López y L. Tapia).

**Buitre Leonado***Gyps fulvus*

Paso de 241 buitres en dirección oeste en Manilva-Casares, extremo occidental de la provincia de Málaga, el 24 de octubre de 2002. Un total de 16 ejemplares siguieron en dirección sur, sobre el mar, sin que se observaran posteriores vuelos de regreso, lo que sugiere que las aves podrían cruzar el Mediterráneo desde esta zona (A. R. Muñoz y M. Altamirano).

**Buitre Negro***Aegyptius monachus*

Observaciones de ejemplares aislados fuera del área de reproducción: acompañando a un bando de 50 buitres leonados en el Mojón de los Cuatro Términos en la Sierra de Hormazas, Álava, el 25 de enero de 2003 (A. Onrubia, J. L. Robles, C. Novoa, M. Sáenz de Buruaga y C. Berducou); junto a un grupo de buitres leonados en Manilva-Casares, Málaga, el 12 de enero de 2004 (A. R. Muñoz y M. Altamirano); con un grupo de 20 buitres leonados entre

Carbajosa y Villafeliz de Sobarriba, León, el 8 de abril de 2004 (J. L. Quiñones, F. Quiñones y C. Sánchez); un ejemplar joven sobrevolando el Monte Maluro, Macizo de Trevinca, Ourense, el 14 de mayo de 2004 (J. Pérez Gil); sobrevolando un área escarpada en el Macizo Central de Ourense, concello de Manzaneda Ourense el 20 de mayo de 2004 (J. Domínguez, J. V. López y L. Tapia); cerca de un punto de aporte de carroñas en la Serra del Portell, Fígols-Alinyà, Lléida, el 5 de junio de 2004 (P. M. Parés); ejemplar con caracteres de adulto en el Puerto de Piqueras, límite de Soria con La Rioja, el 6 de junio de 2004 (J. A. Ucha, J. I. Pérez Sáenz y G. Salcedo); acompañado de cuatro buitres leonados en San Ciprián de Sanabria, Zamora, el 4 de julio de 2004 (J. A. Casado); y en el Valle de Escuaín, Parque Nacional de Ordesa, Huesca, el 10 de octubre de 2004 (F. Sardà). Dos ejemplares en el valle del Alto Bibei, Sierra Segundera, Ourense el 12 de septiembre de 2004 (J. Pérez Gil).

**Aguilucho Cenizo***Circus pygargus*

**Canarias.** En Gran Canaria, donde hay pocos datos: macho en el sector de Aldea Blanca, San Bartolomé de Tirajana, el 19 de marzo de 2004 (M. A. Suárez).

**Busardo Moro***Buteo rufinus*

Se confirma que la especie nidifica en Ceuta: una pareja cría en un pino en la ZEPA de Benzú-Calamocarro, Ceuta, durante la primavera de 2004 y se observan dos pollos volando junto a los adultos a partir de finales de junio (A. Ávila, M. A. Guirado y J. Navarrete).

**Águila Imperial Ibérica***Aquila adalberti*

Observación fuera del área de distribución de la especie: un ave de primer año en una zona adhesionada del término municipal de Ronda, Málaga, el 30 y 31 de noviembre de 2001 (A. R. Muñoz y J. J. Jiménez) y otro el 23 de septiembre de 2002 (A. R. Muñoz y J. J. Jiménez).

**Águila Real***Aquila chrysaetos*

Dos juveniles en compañía de tres milanos negros y un Aguililla Calzada cruzan el Estrecho de Gibraltar, y son observados desde una embarcación de recreo próxima a la isla de Perejil, Melilla, el 1 de octubre de 2003 (M. V. Rodríguez y J. Navarrete).

**Aguililla Calzada***Hieraetus pennatus*

Observación de ejemplares invernantes: uno en la desembocadura del río Guadalfeo, Motril, Grana-

da, el 7 de diciembre de 2003 (J. Pérez Contreras y B. Pérez Machado); uno en vuelo en A Rúa, Ourense, el 6 de diciembre de 2003 (J. Pérez Gil); cuatro aves en la vega de Motril, Granada, el 26 de diciembre de 2003 (D. Quirantes); y un ave de fase clara en las afueras de Torrejoncillo, Cáceres, el 22 de enero de 2004 (J. Prieta).

### Águila Pescadora

*Pandion haliaetus*

Un adulto en el río Duero, San Román de los Infantes, Zamora, el 8 de junio de 2003 (J. A. Hernández y M. I. Martín Rodrigo).

### Cernícalo Patirrojo

*Falco vespertinus*

Cita de ejemplares aislados: un macho de primer año en un grupo de 20 cernícalos primillas en La Corchuela, Toledo, el 29 de mayo de 1989 (M. Crewe); un macho en el extremo norte de la laguna de Fuente de Piedra, Málaga, el 26 de noviembre de 2002 (A. R. Muñoz y A. Jáimez); un ave en el entorno del pueblo de Mendixur, Álava, entre el 16 y el 27 de agosto de 2003 (T. Andrés y A. Onrubia); y un macho en la ZEPA Llanos de Cáceres-Sierra de Fuentes, Cáceres, el 9 de abril de 2004 (I. Fabregat, J. Lorenzo, A. Álvarez y J. Gil). Un ejemplar macho en El Acebuche, P. N. de Doñana, Huelva, el 8 de diciembre de 2003 (R. Moreno-Opo, S. Solís y J. Ramírez).

### Alcotán Europeo

*Falco subbuteo*

Cita muy temprana: un individuo en Villanueva de la Vera, Cáceres, el 2 de febrero de 2004 (D. Langlois).

**Canarias.** En Lanzarote: un ave en las inmediaciones de la Caleta de Famara, Teguiše, el 22 de enero de 2004 (B. Fariña, M. González Acebes y J. D. Delgado). En Fuerteventura: un ave el 2 de julio de 2002 cazando vencejos en Morro Jable, Pájara, a la altura del faro de la playa del Matorral (J. C. Atienza, J. C. Illera y G. P. Farinós).

### Halcón de Eleonora

*Falco eleonora*

Ejemplares aislados en la isla de Alborán, Almería: uno de fase oscura, el 5 de julio de 2003 y uno de fase clara, el 19 de agosto de 2003 (M. Paracuellos, J. C. Nevado, J. A. Oña, C. Palanca, J. J. Alešina y A. Rodríguez). Varias observaciones de la especie durante la primavera y verano de 2004 en El Berrocal, Ávila: un ejemplar en fase oscura el 13 de junio; 2 ejemplares en fase oscura y 6 en clara el 20 de junio; 2 ejemplares en fase oscura y 2 en clara el 22 de junio; al menos uno de morfo claro el 23 de junio y finalmente un individuo de fase clara desde el 22 al 30 de agosto. Utilizaban como dormitorio

comunal unos pinos de grandes dimensiones de un pinar en regeneración tras un incendio forestal (M. Gregory).

### Polluela Pintoja

*Porzana porzana*

Un ejemplar en el Corredor Verde del Guadamar, Sevilla, el 24 de marzo de 2004 (F. Chiclana y D. L. Huertas) y otro en las Salinas de los Portugueses, Cádiz, el 25 de marzo de 2004 (F. Chiclana).

Corrección: en *Ardeola* 51:249, los Charcones de Miguel Esteban pertenecen a la provincia de Toledo y no a Ciudad Real como se indicaba.

### Polluela Bastarda

*Porzana parva*

Un ave oída en la laguna de las Cortinas, Bárdenas Reales, en Tudela, Navarra, el 16 de enero de 2004 (A. Artázcoz y J. M. Lekuona) y en el mismo lugar el día 18 de ese mes (J. A. Pérez). Un macho canta insistentemente en Herguijuela, Cáceres, las noches del 4 al 6 de abril de 2004 (J. Muddeman). Una hembra en una pequeña laguna del Parque Natural de Pego-Oliva, Alicante, el 12 de abril de 2004 (F. Atienzar y A. Mestre).

### Polluela Chica

*Porzana pusilla*

Un ejemplar en la Venta del Cruce, Puebla del Río, Sevilla, el 4 de agosto de 2002 (F. Quintana). Una pareja en la Quebrada del Pozo, Marismillas, Parque Nacional de Doñana, Sevilla, el 9 de junio de 2004 y una pareja con dos pollos pequeños en Veta Quemada, Marisma de Hinojos, Parque Nacional de Doñana, Sevilla, el 15 de julio de 2004 (F. Ibáñez). Un total de 37 avistamientos se hicieron en el Parque Nacional de Doñana entre el 21 de abril y el 15 de julio de 2004: las fincas de las Nuevas (2), Marismillas (4), Reserva Biológica de Doñana (2) y Marisma de Hinojos (29) (F. Ibáñez).

### Guión de Codornices

*Crex crex*

Un ejemplar abatido por cazadores en la localidad de Zalduondo, Álava, el 28 de septiembre de 2003 (O. Berdión y A. Onrubia).

### Gallineta Común

*Gallinula chloropus*

**Canarias.** Datos de nidificación en La Palma: adulto en un nido ubicado entre la vegetación en los bordes de un estanque de Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el 17 de julio de 2004. Con posterioridad, el 23 de agosto, el nido estaba vacío pero se descubre otro de descanso, mientras que en un estanque anexo se observó una pareja. En dicho lugar se venía observando regularmente un adulto desde el 29 de marzo de ese año (R. Barone, E. González & J. Alonso).

**Calamón Común***Porphyrio porphyrio*

Colonización reciente de la provincia de Almería: primeros datos históricos de cría de, al menos, dos parejas en la Albufera de Adra y otra en la desembocadura del río Almanzora en 1999; una pareja en la desembocadura del río Antas y siete en la Cañada de las Norias en 2000; una pareja en la desembocadura del río Aguas durante 2001; tres parejas en las Salinas de Cerrillos en 2003; y una pareja en el Pantano de Cuevas y otra en la desembocadura de la Rambla de Morales en 2004. Desde las fechas mencionadas la especie cría de forma persistente en esos humedales (M. Paracuellos, J. P. Enciso, E. González, J. C. Nevado, R. García, T. Martínez y A. Rodríguez). Observación de más de 50 ejemplares en el embalse de Arrocampo, Almaraz-Saucedilla, Cáceres, el 29 de enero de 2004 (J. Briz).

**Focha Moruna***Fulica cristata*

Primera cita de cría en Almería: una pareja en la laguna de la Gravera, junto a las Salinas de Cerrillos, construye el nido e incuba durante mayo de 2004; el 15 de junio se observan dos pollos, de los que finalmente sólo sobrevive y llega a volar uno de ellos. Los ejemplares son provenientes de cautividad de la

Cañada de los Pájaros, Sevilla. También se soltaron sin éxito en la Albufera de Adra y en el Campo de Golf Playa Serena (M. Paracuellos, F. Ortega y J. C. Nevado). Segunda cita para Galicia: un ejemplar en la laguna de Louro, concejo de Muros, A Coruña, al menos entre el 11 y el 18 de agosto de 2004. Estaba marcado con collar blanco y en compañía de varias fochas comunes. Parece ser el mismo ejemplar visto el año pasado en este mismo lugar (*Ardeola*, 50: 347) y que corresponde a un individuo liberado en la laguna de Tíscar (Córdoba) en el año 2002 en el curso de un programa de reintroducción de la especie (R. Serra, L. Ventoso y S. Quintanilla).

**Grulla Común***Grus grus*

Cuatro ejemplares en el Lance de la Virgen, Almería, el 17 de diciembre de 2001 (M. Paracuellos).

**Sisón Común***Tetrax tetrax*

Más de 1.000 ejemplares en varios grupos en cultivos de secano y regadío (arrozal y maizal) de Madrigalejo y Zorita, Cáceres, el 19 de enero de 2002 (Grupo Ornitológico Cacereño/GOCE). Un macho en Villena, Alicante, el 25 de mayo de 2002 (J. Aragoneses). Un individuo marcado con emisor satélite



**Focha Moruna** *Fulica cristata* Segunda cita para Galicia. Laguna de Louro, A Coruña, agosto de 2004. Foto: S. Quintanilla y L. Ventoso.

en Villafáfila, Zamora, inverna en Trujillo, Cáceres, desde octubre y hasta al menos el 28 de diciembre de 2003 (E. García de la Morena).

### Ostrero Euroasiático

#### *Haematopus ostralegus*

Observación en el interior: un individuo adulto en el embalse de los Canchales, Mérida, Badajoz, el 9 y el 11 de agosto de 2004 (F. Prieto).

### Cigüeñuela Común

#### *Himantopus himantopus*

Una pareja en la laguna de Baldaio, Carballo, A Coruña, zona donde su presencia es rara, el 9 de mayo de 1998 (X. Varela). Máximo alcanzado de 602 nidos en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora, durante la temporada 2000 (Personal de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila). Se observan 97 ejemplares en los arrozales próximos a la población de Santa Amalia, Badajoz, el 22 de diciembre de 2003 (F. Prieto). Segunda colonia de nidificación para la provincia de Granada: una pareja en una balsa junto a una vaquería y cuatro parejas en unas balsas de decantación de purines, Darro, el 1 y el 7 de julio de 2004 (J. M. Rivas).

**Canarias.** En Fuerteventura: nidificación de dos parejas, una con dos pollos y otra con tres, de pocos días de edad, el 21 de junio de 2004 en la charca cercana a la Rosa de Catalina García, Tuineje (J. A. Lorenzo y C. González). En Gran Canaria, grupo en paso: hasta 25 ejemplares en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el 24 de marzo de 2004 (J. García Monzón y M. A. Suárez).

### Avoceta Común

#### *Recurvirostra avosetta*

Máximo alcanzado durante las últimas décadas en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora: se cuentan 215 nidos durante la temporada 2003 y se registran hasta 541 ejemplares y 180 nidos durante la temporada de cría 2004 (Personal de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila).

### Alcaraván Común

#### *Burhinus oedipnemus*

Observaciones invernales: un grupo de 106 aves en los cultivos situados en la entrada al Centro de Interpretación de la Reserva Natural de la laguna de Fuente de Piedra, Málaga, desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2002 (A. R. Muñoz y J. M. Ramírez); alrededor de 200 aves en la Finca Ojuelos, Sevilla, el 28 de diciembre de 2002 (M. Villaécija y F. Chiclana) y del orden de 150 aves en la Finca Los Caracoles, Sevilla, el 26 de diciembre de 2003 (F. Chiclana).

### Canastera Común

#### *Glareola pratincola*

Se detectan 12 adultos y un número indeterminado de pollos en un terreno de cultivo de la Comarca

de Cartagena, Murcia, entre el 7 de abril y el 28 de julio de 2004. En la temporada 2003 ya se registró su nidificación en la zona (véase *Ardeola*, 51:250). Esta nueva colonia ha iniciado la reproducción hasta en cuatro puntos distintos por molestias derivadas de la práctica agrícola, ganadera y urbanística, pero parece consolidarse para la Región de Murcia desde que se extinguiera en la década de 1970 (A. Fernández-Caro y J. Sánchez Balibrea). Dos aves en los embalses de las Cañas, Viana, Navarra, el 27 de abril de 2004 (J. Serradilla, J. Rodríguez y J. M. Martínez).

### Chorlitejo Patinegro

#### *Charadrius alexandrinus*

Un adulto con dos pollos en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora, durante la temporada de cría 1997 y una pareja territorial durante la temporada de cría 1998. Desde entonces no se ha vuelto a observar signos de reproducción de la especie (Personal de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila).

**Canarias.** Primera cita en El Hierro: ejemplar de primer año en llano en el interior del aeropuerto, Valverde, el 10 de agosto de 2004 (J. A. Lorenzo). En Gran Canaria: recuento en el entorno de la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, de 4-6 parejas reproductoras el 17 de abril de 2004 (M. A. Suárez). En Tenerife, censo de la población en el área de El Médano, Granadilla de Abona: el 5 y 13 de abril de 2004 se cuentan 17 y 16 aves adultas respectivamente, aparte de dos pollos colicortos, estimándose entre 8-9 parejas (R. Barone y M. A. Hernández).

### Chorlito Carambolo

#### *Charadrius morinellus*

Un grupo de cinco aves (cuatro adultos y un joven) comiendo en un rastrojo en el entorno de las Casas de Ciruela, Ciudad Real, el 5 de septiembre de 2003 y en el mismo sitio un grupo de ocho individuos (cinco adultos y tres jóvenes) el 9 de septiembre de 2003 (F. Casas). Observación de 23 ejemplares en una finca con rastrojos de cereal en Rigüelo, Alfaro, La Rioja, el 4 de septiembre de 2004. El bando estaba formado por adultos y juveniles de ambos sexos, tan sólo tres con plumaje estival. En este lugar ya hay citas de la misma especie en años anteriores y similares fechas (J. A. Ucha). Bando de cuatro ejemplares a 2.750 m de altitud en el Pirineo, en la cumbre del pico Tendeñera, Huesca, el 11 de septiembre de 2004 (J. A. Gainzarain, D. Alday y J. L. Lamarca).

### Chorlito Dorado Europeo

#### *Pluvialis apricaria*

Se observan entre 3.900 y 4.000 ejemplares en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora, el 6 de febrero de 2004 (X. Prieto y M. Otero).

**Chorlito Gris***Pluvialis squatarola*

Observación en el interior: un ave con plumaje nupcial en el Brazo del Este, Sevilla, el 3 de abril de 2004 (F. Chiclana).

**Correlimos de Temminck***Calidris temminckii*

Uno con plumaje invernal en los Charcones de Miguel Esteban, Toledo, el 6 de octubre de 2001 (A. López López). Un individuo en la laguna ornamental del Campo de Golf de Playa Serena, Almería, el 9 de septiembre de 2002 (M. Paracuellos). Un ejemplar en la laguna permanente del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Ciudad Real, el 22 de septiembre de 2003 (P. M. Trejo). Un ave en la Cañada de las Norias, Almería, el 23 de octubre de 2003 (M. Paracuellos). Observación de ocho aves en el corredor verde del Guadamar, Sevilla, el 7 de abril de 2004 (F. Chiclana) y otras 16 aves el 24 de marzo de 2004 (F. Chiclana y D. L. Huertas). Un ejemplar en el humedal de Salburúa, Álava, el 2 y 3 de septiembre de 2004 (J. A. Gainzarain).

**Correlimos Oscuro***Calidris maritima*

Un ave en las Marismas del Odiel, Huelva, el 3 de septiembre de 2004 (F. Chiclana).

**Agachadiza Chica***Lymnocyptes minimus*

Primeras citas recientes seguras para Extremadura en el embalse de Arrocampo, Almaraz-Saucedilla, Cáceres: al menos tres ejemplares el 17 de enero de 2004 (J. Muddeman y Grupo Ornitológico Cacereño/GOCE) y entre siete y nueve aves el 29 de enero de 2004 (J. Briz).

**Agachadiza Común***Gallinago gallinago*

Recuento de 1.130 ejemplares en los arrozales de Galisteo, Cáceres, el 24 de enero de 2004 (J. Prieta).

**Aguja Colinegra***Limosa limosa*

Se cuentan 1.047 aves en el arrozal de Galisteo, Cáceres, el 27 de febrero de 2002 (J. Prieta).

**Aguja Colipinta***Limosa lapponica*

Avistamientos en el interior: 11 ejemplares en el Azud de Riobobos, Campo de Peñaranda, Salamanca, el 17 de junio de 2003 (J. A. Hernández y M. I. Martín Rodrigo); cinco aves (dos hembras, un macho mudando y dos en plumaje de invierno) en el embalse de El Vellón, Guadalix de la Sierra, Madrid el 4

de mayo de 2002, y corresponde a la segunda cita de la especie para la Comunidad de Madrid (G. Martín); en el embalse de los Canchales, Mérida, Badajoz, un ejemplar juvenil el 14 y 15 de septiembre de 2002, dos aves el 2 de noviembre de 2002 y un ejemplar juvenil el 18 y 24 de septiembre de 2003 (F. Prieto).

**Zarapito Real***Numenius arquata*

Fechas tardías: un ave en la laguna del Camino de Villafranca, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 17 de mayo de 2003 (P. M. Tiejó).

**Archibebe Fino***Tringa stagnatilis*

Observaciones en la provincia de Almería: un adulto con plumaje estival en las Salinas de Cabo de Gata el 19 de marzo de 2003; otro en las Salinas de Cerrillos el 18 de marzo de 2003; un ejemplar en los Charcones de Punta Entinas-Sabinar el 23 de julio de 2003; y dos ejemplares adultos en las Salinas de Cabo de Gata, el 17 de enero de 2003 y dos 16 de enero de 2004 (M. Paracuellos).

**Andarríos Bastardo***Tringa glareola*

Un ave en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Ciudad Real, el 22 de septiembre y el 11 de octubre de 2003 (P. M. Trejo).

**Falaropo Picofino***Phalaropus lobatus*

En la provincia de Almería: dos en los Charcones de Punta Entinas-Sabinar el 31 de agosto de 2001; en las Salinas de Cerrillos, dos el 7 de mayo de 2002, tres ejemplares el 29 de julio de 2002, dos el 12 de septiembre de 2002 y uno el 23 de abril de 2004 (M. Paracuellos y R. Alcaina). Un individuo en la charca del Paredón, Campanario, Badajoz, el 8 de octubre de 2004 (V. M. Quintana).

**Falaropo Picogruoso***Phalaropus fulicarius*

Tres aves en la playa de Sancti Petri, Chiclana de la Frontera, Cádiz, el 9 de octubre de 2004 (F. Chiclana y M. Villaécija).

**Gaviota Cabecinegra***Larus melanocephalus*

Un ejemplar adulto en el humedal de Salburúa, Vitoria, Álava el 27 de marzo de 2004 (A. Onrubia). Primera cita de reproducción en la Región de Murcia: una pareja con al menos un pollo en una isla de la charca de interpretación del Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar el 14 de junio de 2004 (J. Sánchez Balibrea).

**Gaviota de Sabine***Larus sabini*

Observaciones de la especie durante trayectos en barco por la costa de Galicia. Se observan 1, 2, 22, 50 y 2 aves a una distancia de la costa entre 2 y 5 millas de cabo Ortegal, Carballo, Fisterra, Carnota y cabo Ortegal, respectivamente, A Coruña, desde el 15 hasta el 21 de septiembre de 2003 (X. Varela).

**Gaviota Reidora***Larus ridibundus*

Reproducción en el interior: unas 120 parejas en la laguna Ballestera, Complejo Endorreico, la Lantejuela, Sevilla, el 2 de mayo de 2004 (F. Chiclana). Reproducción en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora: se registra un máximo durante la temporada 2004 de 64 individuos y 20 nidos (Personal de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila).

**Gaviota de Audouin***Larus audouinii*

Nueva colonia de cría en el Parque Natural de las lagunas de la Mata y Torrevieja: se trata de la segunda colonia de cría creada de forma natural en la Comunidad Valenciana después de la instalada en el Archipiélago de las Columbretes y cercana a la colonia de Isla Grosa (Región de Murcia). Durante el 2003 se hicieron diversas observaciones de serios intentos de reproducción. En 2004, durante la temporada de cría, se observa un grupo variable de alrededor de 30 ejemplares que realizan paradas típicas de cortejo, cópulas y aporte de material al nido. El 6 de mayo se constata la presencia de al menos 5 nidos con huevos que están siendo incubados (J. A. Pujol y A. Sáez Moñino). Dos individuos adultos junto con una Gaviota Reidora en el embalse de Canales, Granada, el 22 de mayo de 2004. Es un embalse que se encuentra en la cara norte de Sierra Nevada, por tanto alejado de la costa, y a unos mil metros de altitud (J. Pérez Contreras y B. Pérez Machado). Paso migratorio postnupcial en el río Guadiana en Mérida, Badajoz: desde el 2002 se están registrando observaciones (véase *Ardeola*, 50: 350). Durante el 2004 la primera observación corresponde a 18 ejemplares juveniles el 30 de julio, después se observan 13 aves juveniles el 31 de julio, y en el mes de agosto seis juveniles el día 3, un adulto y seis juveniles el día 4, un adulto y cinco juveniles el día 7, dos juveniles el día 8, un adulto y cinco juveniles el día 9, un adulto y seis juveniles el día 11 y un juvenil el día 22. Parecen corresponder a ejemplares procedentes del Delta del Ebro (Tarragona), pues como en anteriores observaciones algunos individuos portan anillas de PVC blanco. Suelen ir acompañadas de grupos de Gaviota Reidora. En numerosas ocasiones se pudo observar la captura de peces gato y en una ocasión arrebatar esta presa a una Gaviota Reidora (F. Prieto).

**Gaviota Cana***Larus canus*

En las Salinas de Cerrillos, Almería, un ejemplar, el 16 de julio de 2002 y un adulto, posiblemente el mismo ejemplar, el 12 de septiembre de 2002 (M. Paracuellos).

**Gaviota Patiamarilla***Larus michahellis*

Un ave con plumaje de primer invierno río Guadiana, Mérida, Badajoz, el 1 de noviembre de 2000, fue anillado ese mismo año en la isla de Benidorm, Alicante (F. Prieto). Un adulto en el embalse de los Canchales en Mérida, Badajoz, el 24 de septiembre de 2003 (F. Prieto). Un adulto en el río Guadiana en Mérida, Badajoz, el 2 de noviembre y 6 de diciembre de 2003 (F. Prieto).

**Canarias.** Corrección: en *Ardeola* 51:251-252, en Fuerteventura, el recuento de colonias durante la temporada de 1998 es de al menos 1.160-1.225 parejas reproductoras: 280 en Montaña Roja (La Oliva), 20-25 en la punta del Cháfiro (Antigua/Tuineje), al menos 190-200 en la punta de Barlovento y 170-190 en la punta de las Hendiduras de Amanay (Pájara), así como 70-75 en la Cabezada la Rusia (Aguas Verdes, Betancuria), mientras que en el islote de Lobos se calculan unas 430-455 parejas repartidas por La Caldera (mín. 230) y el área de Atalaya del Faro e inmediaciones (200-225) (C.-J. Palacios).

**Gavión Atlántico***Larus marinus*

Observación en el interior: un ejemplar adulto en la laguna Grande de Villafranca de los Caballeros, Ciudad Real, el 14 de septiembre de 2002 (P. M. Trejo).

**Pagaza Piconegra***Gelochelidon nilotica*

Reproducción en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora: se registra un máximo durante la temporada de cría 2004 en la que se anotan 120 aves y 62 nidos (Personal de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila).

**Pagaza Piquirroja***Sterna caspia*

Dos ejemplares en isleta del embalse de Los Canchales, Mérida, Badajoz, el 18 de septiembre de 2002 (F. A. Prieto y J. L. Valiñas).

**Charrán Bengalí***Thalasseus bengalensis*

Observación postnupcial de 4, 8 y 13 aves en el puerto de Melilla, el 6 de octubre, 1 de noviembre y 30 de noviembre de 2003 (D. Jerez y R. Ramírez). Un individuo en la Playa de Montijo, Chipiona, Cádiz, el 29 de junio de 2004 (F. Chiclana). Un ave en la playa de Sancti Petri, Chiclana de la Frontera, Cádiz, el 9 de octubre de 2004 (F. Chiclana y M. Villaécija).

**Fumarel Aliblanco***Chlidonias leucopterus*

En las Salinas de Cerrillos, Almería, un ejemplar el 7 de mayo de 2002 y otro el 27 de agosto de 2003 (M. Paracuellos). Un individuo en las Marismas del Odiel, Huelva, el 31 de agosto de 2004 (F. Chiclana).

**Alca Común***Alca torda*

Ocho aves en el puerto de Melilla el 15 de noviembre de 2003 (D. Jerez y R. Ramírez).

**Ganga Ortega***Pterocles orientalis*

Observación de cinco, tres y dos ejemplares en distintas localidades de Villena, Alicante, el 23 de febrero, el 4 de marzo y el 5 de junio de 2002, respectivamente (J. Aragoneses).

**Tórtola Turca***Streptopelia decaocto*

**Canarias.** En El Hierro, durante los meses de abril, mayo y junio de 2004, se constata la presencia de esta especie, así como de indicios y pruebas de cría, en los siguientes enclaves: La Caleta, Tamaduste, Valverde, Echedo, El Mocanal, Guarazoca, San Andrés e Isora (Valverde), así como Las Puntas, Frontera, Tigaday, Los Llanillos, Sabinosa, El Pinar y La Restinga (Frontera). Dada su distribución actual en esta isla, puede afirmarse que esta especie se ha asentado ya en el conjunto del archipiélago canario (J. A. Lorenzo).

**Cotorra Argentina***Myopsitta monachus*

Un bando de 10 ejemplares en vuelo por Benejama, Alicante, el 25 de septiembre de 2002 (J. Aragoneses).

**Cotorra de Kramer***Psittacula krameri*

Varios ejemplares en Benavente, Zamora, el 20 de octubre de 2003 (J. A. Casado). Al menos una pareja criando en el Campo de Golf de Almerimar, Almería el 9 de septiembre de 2002 (M. Paracuellos).

**Cuco Común***Cuculus canorus*

**Canarias.** En Gran Canaria, donde hay pocos datos: ejemplar posado en zona de cultivos en Las Remudas, Telde, el 3 de enero de 2003 (M. A. Suárez).

**Críalo Europeo***Clamator glandarius*

Un ejemplar joven en la Parroquia de Bouses, Oímbra, Ourense, el 8 de julio de 2004 (J. Pérez Gil).

**Búho Campestre***Asio flammeus*

Observación de uno y dos ejemplares en época de cría en San Agustín del Pozo, Zamora, el 25 de junio y 5 de julio de 2003, respectivamente (J. A. Casado). Un ave en una zona de cultivo en Los Santos de la Humosa, cerca del límite municipal con Alcalá de Henares, Madrid el 29 de abril de 2004 (J. Martínez Rodenas).

**Chotacabras Europeo***Caprimulgus europaeus*

Dos ejemplares reclamando en distintas áreas del término municipal de Biar, Alicante, el 13 de mayo, 13 de junio y el 15 de septiembre de 2002 (J. Aragoneses).

**Chotacabras Pardo***Caprimulgus ruficollis*

Puesta muy tardía para el sur de España (véase *Ardeola*, 50: 215-221): un adulto incubando un huevo en la Dehesa de Mezquetillas, Hornachuelos, Córdoba el 17 de julio de 2002 (P. M. Dobado-Berrios).

**Vencejo Pálido***Apus pallidus*

Primera cita para La Rioja: un ave volando junto a un Vencejo Real sobre el Parque del Ebro, Logroño, el 27 de abril de 2004 (J. Serradilla).

**Vencejo Cafre***Apus caffer*

Un ejemplar avistado en Cazalla de la Sierra, Sevilla, el 20 de junio de 2004. Observado en una localidad con presencia habitual de la especie en época de cría, en la que ya ha intentado reproducirse desde el año 2000 (M. C. Pérez Gómez). Dos aves en la Sierra de la Plata, Cádiz, el 8 de mayo de 2004 (F. Chiclana, R. Martín-Baylo, J. de la Cruz y M. Rouco).

**Carraca***Coracias garrulus*

Una pareja reproductora en una dehesa de roble melojo de Gargüera, Cáceres, en mayo de 2002 y de 2003. Constituye la única cita de cría reciente en la comarca de La Vera (J. Prieta).

**Canarias.** En La Palma, observación reciente: ejemplar en una zona entre El Remo y El Charco Verde, Los Llanos de Aridane, el 3 de julio de 2004 (R. Pedrianes).

**Pito Negro***Dryocopus martius*

Detectado un ejemplar en un hayedo maduro de la zona basal de los Montes de Iturrieta, Guereñu, Álava, el 7 de mayo de 2004 (A. Onrubia).

**Pico Menor***Dendrocopos minor*

Nuevas localidades: un ejemplar en una zona de melojar y vegetación ribereña junto al Espacio Natural Pinar de Hoyocasero, Ávila, el 11 de julio de 2003 (M. A. de la Cruz/ARDEIDAS). Un macho en las riberas del río Cabreira, entre Santalavilla y Llamas de Cabreira, León, el 2 de junio de 2004, en una zona con castaños, alisos, fresnos y algunos cecezos de gran porte (J. A. Hernández).

**Alondra de Dupont***Chersophilus duponti*

Se detecta un ejemplar cantando durante más de 15 minutos en una zona con matorral de escaso porte con predominio de espartal en el paraje de Pozo Sastre, Húscar, lindando con los Llano de Orce, Granada, el 27 de octubre de 2002 (C. Palanca).

**Golondrina Común***Hirundo rustica*

**Canarias.** En Gran Canaria, datos recientes de cría de la pequeña población descubierta en la temporada de 2000 en El Matorral, San Bartolomé de Tirajana: el 14 de julio de 2001 se halló un nido ocupado con cuatro pollos que en fechas posteriores consiguieron emanciparse, tratándose según lugareños de una tercera puesta (M. A. Suárez y F. del Campo). De nuevo el 28 de febrero de 2002 las aves están por la zona, y en fechas posteriores construyen nido, llegando a efectuar dos puestas de las que consiguen volar cuatro y dos pollos respectivamente (M. A. Suárez).

**Golondrina Daúrica***Hirundo daurica*

Primera cita de reproducción para el País Vasco: se observa a una pareja entrando a un nido en el pórtico de la ermita de Oro, Zuia, Álava desde el 14 de junio de 2004 al 31 de julio de 2004 (J. A. Gainzarain y R. Arambarri).

**Canarias.** En La Palma: hasta ocho aves contabilizadas en el sector de Las Martelas, Los Llanos de Aridane, entre el día 1 de marzo y el 8 de marzo de 2004 (J. M. Castro).

**Bisbita Campestre***Anthus campestris*

Citas en Extremadura donde hay pocos datos: un individuo cerca del embalse de Guadaloba, Cáceres, el 3 de abril de 2004 (J. Prieta); un ave en Vegas Altas, Badajoz, el 18 de abril de 2004 (J. Muddeman) y dos o tres parejas en Sta. María de Magasca, Cáceres, el 22 de abril de 2004 (J. Muddeman).

**Bisbita Arbóreo***Anthus trivialis*

**Canarias.** En Gran Canaria, donde se conocen pocos datos: ejemplar en la Charca de Maspalomas,

San Bartolomé de Tirajana, el 24 de marzo de 2004 (J. García Monzón).

**Lavandera Blanca***Motacilla alba*

Citas correspondientes a la subespecie *yarrellii*: unos 80 ejemplares, junto a otros 20 de la subespecie nominal, en Laviana, Gozón, Asturias, el 23 de febrero de 2002 (M. Quintana); uno en el Puerto de Gijón, Asturias, el 16 de noviembre de 2003 (A. López López); un ave en Guadalperales, Badajoz, el 2 de enero de 2004 (M. Jiménez y J. M. Tapia); y un ejemplar en el casco urbano de Plasencia, Cáceres, el 25 de enero de 2004 (J. Prieta).

**Acentor Alpino***Prunella collaris*

Dos individuos invernantes en la Sierra Salinas, Villena, Alicante, el 15 de diciembre de 2002 (J. Aragoneses). Varios individuos durante el invierno de 2002 en Biar, Alicante, dos ejemplares el 8 de enero, dos el 13 de diciembre y cuatro el 24 de diciembre (J. Aragoneses). Al menos dos ejemplares alimentándose en una zona de esparto al borde de los acantilados marinos en el Faro de Cabo Tiñoso, Murcia, el 13 de marzo de 2004 (J. Sánchez Balibrea/ANSE).

**Zorzal Real***Turdus pilaris*

**Canarias.** En Tenerife, donde se considera accidental: ave observada en las charcas de Erjos, Los Silos/San José de los Llanos, el 7 de marzo de 2004 (P. Palmer, A. Lea y C. Hughes).

**Curruca Carrasqueña***Sylvia cantillans*

**Canarias.** En Gran Canaria: una en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el 20 de marzo de 2004 (M. A. Suárez).

**Curruca Zarcera***Sylvia communis*

**Canarias.** En Fuerteventura: hasta cinco aves el 8 de marzo de 2003 en el islote de Lobos, La Oliva (M. A. Suárez). En Gran Canaria: dos en terrenos con cultivos abandonados en Vecindario, Santa Lucía, el 23 de abril de 2004 (M. A. Suárez).

**Mosquitero Silbador***Phylloscopus sibilatrix*

Un individuo capturado para anillamiento científico en el Valle de Barluenga, Huesca, el 19 de abril de 2003 (J. C. Albero/Grupo Zaragoza).

**Canarias.** En Gran Canaria: dos ejemplares en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el 24 de marzo y sólo uno el 26 de marzo de 2004 (M. A. Suárez).

**Mosquitero Ibérico***Phylloscopus ibericus*

Un ave cantando y defendiendo territorio en el puerto de Piornal, Cáceres, en junio de 2001 y de 2002 (J. Prieta). Un ejemplar cantando y marcando territorio en el bosque de La Herrería, San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el 22 de mayo de 2004 (R. Moreno-Oppo y A. Sallent).

**Mosquitero Musical***Phylloscopus trochilus*

Se detecta cantando un ejemplar en un hayedo maduro de los Montes de Vitoria, Álava, el 27 de mayo de 2003 (A. Onrubia).

**Reyezuelo Sencillo***Regulus regulus*

Dos aves en invernada en la Sierra de Almijara, Nerja, Málaga, el 27 de diciembre de 2003 (I. García Páez). Una de las poquísimas citas de Badajoz: al menos un ejemplar, posiblemente alguno más, en un pinar de Calera de León, el 31 de diciembre de 2003 (J. Salcedo). Dos ejemplares en una zona denominada Las Corzas, Tarifa, Cádiz, el 24 de enero de 2004 (A. R. Muñoz).

**Reyezuelo Listado***Regulus ignicapilla*

Reproducción confirmada en la Reserva Ecológica Puerto Moral, Aroche, Huelva, donde no se había registrado hasta el momento: dos hembras capturadas para anillamiento presentaban placa incubatriz, el 5 de abril de 2003 y el 5 de abril de 2004. (E. Alés, M. Barrera, F. Romero, P. Sáez y C. Camacho/Estación Ornitológica Anastasio Senra).

**Agateador Norteño***Certhia familiaris*

Detectado un ejemplar en los Montes de Vitoria, municipio de Vitoria, Álava, el 19 de marzo de 2003 (A. Onrubia).

**Gorrión Alpino***Montifringilla nivalis*

Tres ejemplares en las crestas calizas de la Sierra de Cantabria, Álava, el 3 de febrero de 2004 a 1.400 m de altitud (J. A. Gainzarain).

**Pinzón Real***Fringilla montifringilla*

Un macho con plumaje estival en Cistierna, León, el 3 de mayo de 2004 (J. L. Aldea y T. Sanz). Unos 30 individuos en Madrigal de la Vera, Cáceres, el 3 de enero de 2004 (D. Langlois).

**Verderón Serrano***Serinus citrinella*

Se confirma la reproducción de la especie en el Puerto de la Ragua, P. N. Sierra Nevada, Almería, el 1 de julio de 2004: se observa ceba a un pollo volan-

dero que solicita comida a un adulto. Este lugar corresponde al lugar de cría más meridional de la especie (M. Gámez y J. Garzón). En el mismo lugar, al menos 10 aves los días 8 y 18 de septiembre de 2004 (I. García Páez y F. Guerrero).

**Piquituerto Común***Loxia curvirostra*

Seis aves, al menos un joven y una hembra en Chaguazoso, A Mezquita, Ourense, el 6 de julio de 2004, donde no se había detectado esta especie como reproductora (J. Pérez Gil).

**Escribano Nival***Plectrophenax nivalis*

Observaciones en área tradicional de invernada de A Coruña: un bando de nueve ejemplares en el cordón dunar de Baldaio, Carballo, el 6 de diciembre de 1998 (A. Burgas y X. Varela); ocho ejemplares en la playa de A Barra, estuario del Anllóns, Ponteceso, el 23 de diciembre de 1999 (D. Romai y X. Varela); tres ejemplares en campos costeras en el complejo litoral de Baldaio, Carballo, desde el 23 de enero al 19 de febrero de 2000 (X. Varela); dos aves en el cordón dunar de Baldaio, Carballo, el 24 de febrero de 2001 (X. Varela); un ejemplar en el complejo litoral de Baldaio, Carballo, el 23 de noviembre de 2002 (A. A. Pombo y X. Varela); y un macho en la playa de Baldaio, Carballo, el 22 de noviembre de 2003 (X. Varela).

Un macho con plumaje invernal en el Valle de Valdosín, La Uña, León, el 18 de octubre de 2003. El ave se encuentra a 1.275 m de altitud, en pastizales y praderas de montaña (J. M. Fernández García y J. Echeagaray). Un macho adulto comiendo junto a un bando de terreras comunes y terreras marismas en el muro de la FAO, entre el Parque Nacional y Parque Natural de Doñana, Hinojos, Huelva, el 11 de diciembre de 2003, aunque ya se había observado dos días antes a unos 3 km del lugar anterior (F. Ibañez). Primera cita en Cáceres y Extremadura: un macho en Belén, Trujillo, Cáceres el 31 de diciembre de 2003 (S. Villa). Un grupo de 15 aves (cuatro machos y siete hembras) en el Monte Oiz, Vizcaya, el 31 de enero de 2004 (A. Onrubia, J. M. Unamuno, E. Unamuno y A. Unamuno). Cita invernal en áreas montañas fuera de las localidades habituales de observación en la costa gallega, se anotan tres ejemplares en la zona de cumbres (1.000 m s.n.m.) en la Serra do Xistral, Lugo, el 19 de febrero de 2004 alimentándose en pastizales naturales y áreas revegetadas de un parque eólico (L. Tapia y L. Fontán).

**Escribano Palustre***Emberiza schoeniclus*

Una hembra reproductora de la subespecie *E. s. witherbyi*, con placa incubatriz en regresión, capturada para anillamiento en el embalse de Almoguera, Guadalajara, el 17 de julio de 2004 (R. Moreno-Oppo, P. Alcázar y M. P. Frutos).



**Escribano Palustre** *Emberiza schoeniclus* subsp *witherbyi*. Embalse de Almoguera. Guadalajara, julio de 2004. Foto: P. Alcázar.