

NOTICIARIO ORNITOLOGICO 1998

Recopilado por Javier DE LA PUENTE, Juan Antonio LORENZO (Islas Canarias)
y Eduardo DE JUANA

Colimbo Chico

Gavia stellata

En la ría del Eo (Lugo). ej. del 13 al 16 de diciembre de 1997 (L. J. Salaverri).

Colimbo Grande

Gavia immer

En diciembre de 1997, cuatro ads. en la bahía de Cádiz (Cádiz) los días 9 y 10 (E. Muñoz Charro), un ej. en el puerto de Sant Feliu de Guíxols (Girona) el 26 (C. Alvarez Cros) y cinco en Ortigueira (A Coruña) el 28 (P. Gutiérrez Varga y A. Gutiérrez Pita).

Zampullín Chico

Tachybaptus ruficollis

Importante concentración en época de cría en la provincia de Soria: 86 aves, dos incubando, en el embalse de Monteagudo de las Vicarías el 24 de junio de 1991 (J. Román Sancho).

Somormujo Lavanco

Podiceps cristatus

En el embalse de Monteagudo de las Vicarías (Soria), 10 pp. el 15 de mayo de 1991 (J. Román Sancho) y 42 aves el 18 de enero de 1998 (F. Chaguaceda y L. M. Reguero).

Somormujo Cuellirrojo

Podiceps grisegena

Un ave en las marismas de Santoña (Cantabria) el 14 de enero de 1996 (J. Román Sancho y F. Jubete Tazo). Un ej. en la bahía de Txingudi (Guipúzcoa) los días 29 y 30 de diciembre de 1996 (D. Calleja, L. Almigol y C. Almigol). Ave de 1er. inv. en una laguna del complejo litoral de Baldaio, Carballo (A Coruña) el 22 de noviembre de 1997 (A. Pombo).

Zampullín Cuellinegro

Podiceps nigricollis

Concentración en época reproductora en el embalse de Monteagudo de las Vicarías (Soria): 30 aves el 15 de mayo de 1991 y 41 aves el 24 de junio de 1991 (hay cuatro ads. acompañados de pollos) (J. Román Sancho). En Guipúzcoa, donde la especie es invernante muy escasa, 11 aves en la bahía de Txingudi el 3 de enero de 1997 (D. Calleja y M. Guereñu).

Fulmar Boreal

Fulmarus glacialis

Un ej. pasa hacia O frente al cabo Estaca de Bares

(A Coruña) el 28 de septiembre de 1997 (P. Gutiérrez Varga, A. Gutiérrez Pita, K. Duus y A. Sandoval).

Petrel de Bulwer

Bulweria bulwerii

Canarias. Nuevas localidades de cría en Tenerife: en derrubios bajo acantilados en el macizo de Teno, Buenavista del Norte, el 9 de junio de 1996 se hallan cinco huras, tres con aves incubando y dos con aves muertas, mientras el 23 de junio de 1996 sólo hay cáscaras de huevos; en una repisa en los mismos acantilados, pero en el extremo de Santiago del Teide, se hallan dos pollos muertos —presumiblemente depredados— y, en desplomes en la base del risco, el 2 de agosto de 1997 se detectan varias huras y restos de cuatro huevos y de un pollo —posiblemente depredado por ratas (M. Siverio, J. J. Ramos y D. Trujillo).

Pardela Cenicineta

Calonectris diomedea

En Guipúzcoa, donde la especie es muy escasa en primavera, frente al cabo Higuer, Hondarribia, 42 ej. pasan hacia el O —a lo largo de una hora de observación— el 12 de mayo de 1995 (D. Calleja y M. Guereñu). Censo en el islote de Terreros (Almería): al menos 6 pp. nidificantes el 14 de agosto de 1997 (J. P. Enciso, M. Lara, J. C. Nevado y M. Paracuellos).

Pardela Capirotada

Puffinus gravis

Canarias. Hasta 15 ej. el 24 de agosto de 1997 en una travesía entre La Gomera y Tenerife (E. García del Rey / Aves Ecotours).

Pardela Sombria

Puffinus griseus

Un total de 1.659 aves pasan en migración hacia O frente al cabo Estaca de Bares (A Coruña) el 1 de octubre de 1997 (P. Pita y K. Duus).

Pardela Pichoneta

Puffinus puffinus

Canarias. En Tenerife, se escuchan de noche varios ej. en el barranco de Ruiz, Los Realejos/San Juan de la Rambla, el 14 de febrero de 1991 (D. Trujillo). En El Hierro, ej. muerto en la playa de Arenas Blancas, ca. Sabinosa, Frontera, el 9 de febrero de 1992 (D. Trujillo).

Pardela Mediterránea*Puffinus yelkouan*

En Guipúzcoa, frente al cabo Higuer, Hondarribia, 1.294 ej. pasan hacia O —en una hora de observación— el 12 de mayo de 1995 (D. Calleja y M. Guereñu).

Paño Europeo*Hydrobates pelagicus*

Tras un fuerte temporal se observan más de 100 ej. muy próximos a la costa frente al puerto-refugio de Hondarribia (Guipúzcoa) el 4 de enero de 1997 (D. Calleja y M. Guereñu). En el islote de Terreros (Almería) al menos 2 pp. nidificantes el 14 de agosto de 1997 (J. P. Enciso, M. Lara, J. C. Nevado y M. Paracuellos).

Paño Boreal*Oceanodroma leucorhoa*

En un corto trecho de la costa de Benzú, Ceuta, se contabilizan 61 ej. —arrastrados al Estrecho por el fuerte viento de SO— el 24 de diciembre de 1996 (D. Berral). Tras fuerte temporal, 28 ej. muy próximos a la costa frente al puerto-refugio de Hondarribia y 16 frente al cabo Higuer (Guipúzcoa) el 4 de enero de 1997 (D. Calleja y M. Guereñu). Un ave capturada en pleno centro urbano de Llanes (Asturias) el 2 de diciembre de 1997 (L. Carrera).

Alcatraz Atlántico*Sula bassana*

Hasta 1.068 ej. por hora pasan en migración frente al puerto-refugio de Hondarribia (Guipúzcoa) el 12 de octubre de 1997, con temporal y viento del NO (D. Calleja).

Cormorán Grande*Phalacrocorax carbo*

En Soria, enero de 1998, se censan 71 aves en el embalse de La Cuerda del Pozo el día 17 y 344 en el embalse de Monteagudo de las Vicarías el día 18 (F. Chaguaceda y L. M. Reguero).

Avetoro Común*Botaurus stellaris*

Al menos tres ej., dos de ellos cantando, en la laguna de Pitillas (Navarra) el 24 de mayo de 1997 (D. Calleja y M. Guereñu). Un ej. en la laguna de Valdoviño sobrevuela los carrizos los días 7 y 14 de octubre de 1997 (P. Gutiérrez Vega, P. Pita Criado y A. Gutiérrez Pita).

Avetorillo Común*Ixobrychus minutus*

En invierno, un ave en las albuferas de Adra (Almería) el 5 de febrero de 1997 (M. Paracuellos) y otra en formación de espadañas a orillas del río Zújar en Campanario (Badajoz) el 29 de noviembre y el 9 de diciembre de 1997 (J. L. Pérez Chiscano). Repe-

tidas observaciones de un macho en vuelo en la laguna de Valdoviño (A. Coruña) a lo largo de la primera quincena de julio de 1997 (A. Gutiérrez Pita, P. Pita Criado y P. Gutiérrez Varga).

Canarias. Primer dato de cría en Tenerife: macho ceba al menos tres pollos en una charca de riego entre Tejina y Bajamar, La Laguna, el 28 de mayo de 1997, y se ve un pollo emancipado el 15 de junio siguiente; además, en otra charca en Valle Guerra, a cierta distancia de la localidad anterior y en esa misma época, se detecta otra pareja que no muestra conducta de cría (A. Palacios y C. J. Palacios).

Martinete Común*Nycticorax nycticorax*

Canarias. Grupos importantes en Tenerife: en las charcas de Erjos, Los Silos/El Tanque, 12 y 13 aves los días 16 y 17 de abril de 1994 (M. Silverio y M. Fdez. del Castillo); en la presa de Curbelo, Adeje, hasta nueve ej. el 23 de abril de 1994 (D. Trujillo); en charca de riego entre Tejina y Bajamar, La Laguna, grupo de 10 aves el 6 de junio de 1997 (C. J. Palacios y M. Nistal). En La Gomera, donde hay pocos datos, ad. en el embalse de Las Rosas, Agulo, el 6 de marzo de 1992 (D. Trujillo).

Garcilla Cangrejera*Ardeola ralloides*

Nueva localidad de cría en Huesca: en una colonia de garzas instalada en 1996 en la cola del embalse del Pas, Belver de Cinca, el 18 de junio de 1997 se observan cinco ads. y tres pollos volantones (J. D. Moreno-Rodríguez, M. Alcántara y M. A. Cebollada).

Canarias. Primera cita para La Gomera: juv. en el barranco de La Villa, San Sebastián, el 29 de marzo de 1992 (K. W. Emmerson y R. Barone).

Garcilla Bueyera*Bubulcus ibis*

Observaciones fuera del área habitual: dos aves en la bahía de Txingudi (Guipúzcoa) el 22 de septiembre de 1997 (D. Calleja), y siete en los alrededores de Pétrola y la estación de Chinchilla (Albacete) los días 25 y 27 de diciembre de 1997 (A. Gómez Gómez).

Canarias. En Gran Canaria, nueve aves ca. costa de Vargas, Agüimes, el 5 de diciembre de 1992 (R. Barone y D. Trujillo). En La Gomera, donde hay pocos datos, individuo en zona de cultivos y estanques en La Dama, Vallehermoso, el 10 de febrero de 1996 (R. Barone).

Garceta Grande*Egretta alba*

En 1997: ej. en la laguna de La Magarola, delta del Llobregat (Barcelona), 26 de octubre (J. Campderròs y P. García Campderròs); ad. a orillas del Zújar, Campanario (Badajoz), 27 y 29 de noviembre

(J. L. Pérez Chiscano); ej. en balsas de acuicultura de Trebujena (Cádiz), 16 de septiembre (V. Fdez. Pasquier), y dos ej. junto al río Arillo, San Fernando (Cádiz), 22 de noviembre a 2 de diciembre (E. Muñoz Charro y D. Agüera).

Garza Real

Ardea cinerea

Concentración de 75 aves en la laguna de Villaverde (Albacete) el 5 de enero de 1997 (A. Gómez Gómez).

Cigüeña Blanca

Ciconia ciconia

Canarias. En Tenerife, juv. en la balsa de La Cruz Santa, Los Realejos, el 18 de septiembre de 1992 (M. Siverio y D. Trujillo) y ej. en la punta de Teno, Buenavista del Norte, del 2 al 29 de marzo de 1997 (B. R. Martín y J. J. Ramos).

Morito Común

Plegadis falcinellus

Un ave en gravera de Las Vegas (Burgos) el 16 de octubre de 1993 (F. Román, L. M. Ansole y J. Santamaría). Otra en las salinas de Cabo de Gata (Almería) el 30 de octubre de 1996 (M. Paracuellos). Bando de 60 aves, varias anilladas, el 26 de diciembre de 1997 en las marismas de El Rocío (Huelva) (J. I. García-Abasolo).

Invernada en Almería: un ej. en la desembocadura del río Antas el 10 de noviembre de 1996 y siete a partir del 22 de diciembre, de los que seis permanecen hasta el 30 de abril; el 5 de noviembre de 1997 aparecen de nuevo cuatro aves, lo que confirma la invernada en esta localidad a partir de 1994 (J. P. Enciso y M. de Lara).

Canarias. Primera observación en Fuerteventura: tres ej. en charca de riego al sur de Tesejerague, Tuineje, el 25 de septiembre de 1990 (S. Scholz).

Ibis Sagrado

Threskiornis aethiopicus

Canarias. En Fuerteventura, cinco aves observadas en «Gorrións Beach» el 3 de abril de 1996 (N. D. Galloway) proceden con seguridad de una colección zoológica particular situada en Morro Jable (cita examinada por el Comité de Rarezas).

Espátula Común

Platalea leucorodia

Nueva colonia de reproducción: en el P. Nat. Bahía de Cádiz, el 11 de abril de 1997 se cuentan 37 ads., 2 subads. y al menos 20 pollos, formando colonia sobre los muros de una antigua salina abandonada; el 15 de abril hay 44 ads., 3 subs. y 81 pollos (26 en el nido, de los que se anillan 24), y el 25 de abril, 27 ads., 2 subs. y 71 pollos (12 en su primera semana de vida). El 19 de junio ya no quedan aves en la colonia y se cuentan 28 nidos del año, así como 23 ni-

dos que aparentemente corresponden a 1996, año en que el 22 de mayo se censaron 50 aves (G. M. Arroyo, F. Hortas, C. de le Court, E. Urbina, F. Oliveros, I. Sánchez y M. A. Barragán).

Otras observaciones en 1997: ad. en laguna junto al basurero de Cáceres el 8 de julio de 1997 (J. A. Ojalvo y J. M. Herranz Fdez.); tres ims. en vuelo sobre la ría de Foz (Lugo) el 13 de noviembre (L. J. Salaverri); dos inms. en la ría del Eo (Lugo/Asturias) del 19 al 21 de noviembre y uno del 22 de noviembre hasta, quizás, el 2 de diciembre ((L. J. Salaverri y otros); inm. en la ría de Ortigueira (A Coruña) el 2 de diciembre (L. J. Salaverri); ej. en Villafáfila (Zamora) el 8 de diciembre de 1997 (J. Colás y M. Carabajo /SEO-Valladolid).

Canarias. Primera cita para El Hierro: juv. en la presa de Tefirabc, Valverde, los días 17 y 19 de septiembre de 1996 (aparece muerto al día siguiente) (D. Trujillo y C. González).

Flamenco Común

Phoenicopterus ruber

Algunas observaciones en la laguna de Pétrola (Albacete): unas 100 aves en diciembre de 1991; dos inms. y un ad. el 2 de enero de 1993, siete individuos el 21 de marzo de 1993, y 25-30, varios inms., el 6 de junio de 1993 (A. Gómez Gómez). Un inm. en la laguna de Retamar, Torremegía (Badajoz), el 31 de diciembre de 1997 (J. Antolín).

Cisne Negro

Cygnus atratus

Grupo de cinco aves, que vuelan perfectamente, en Santoña (Cantabria) el 7 de enero de 1995 (J. Román, F. Román y F. Jubete). Dos aves, que también vuelan bien, en la bahía de Txingudi (Guipúzcoa) el 16 de septiembre de 1997 (comunicado por D. Calleja).

Ampliación de fechas: el ad. observado en la ría del Eo (Lugo) el 24 de agosto de 1997 (*Ardeola*, 44: 246) permaneció al menos hasta el 11 de septiembre siguiente (L. J. Salaverri).

Ansar Campestre

Anser fabalis

Concentración de 102 aves en Piedrahita de Castro (Zamora) el 22 de enero de 1992 (J. Román y C. Gutiérrez Expósito). Observaciones en Villafáfila (Zamora): un ave el 13 de enero de 1991, otra el 15 de noviembre de 1992 y cinco el 21 de enero de 1996 (J. Román, F. Román, F. Jubete y C. Palma).

Ansar Careto

Anser albifrons

Diversas observaciones en Villafáfila (Zamora): un ave el 24 de diciembre de 1989, cinco el 13 de enero de 1990 y seis el 13 de enero de 1991 (J. Román, F. Román y F. Jubete).

Ansar Común*Anser anser*

Grupo de 387 aves pasta a orillas del embalse de Arroyo Conejo, Higuera de Llerena (Badajoz), el 14 de diciembre de 1997 (F. Gragera y L. Salguero).

Barnacla Cariblanca*Branta leucopsis*

Observaciones en Villafáfila (Zamora): cinco aves el 21 de enero de 1990, una el 18 de enero de 1992 y otra el 3 de diciembre de 1994 (J. Román y F. Jubete); nueve ejes. el 25 de enero de 1998 (D. Moreno Mateos). Un ave en la ría de Ortigueira (A. Coruña) el 12 de enero de 1997 (P. Pita Criado). Un ave en compañía de Ánsares Comunes en la laguna de El Oso (Ávila) entre el 7 de diciembre de 1997 y el 7 de febrero de 1998 (A. Lanz Esteve).

Barnacla Carinegra*Branta bernicla*

En la ría de Foz (Lugo) hasta nueve aves del 2 al 16 de febrero de 1997 (L. J. Salaverri, A. Glez. Redondo, F. Barrera, F. J. Fdez. Otero y J. C. Díaz Pazos), y en el invierno siguiente cuatro aves —tres ads. y un 1er. inv.—, con dos el 3 de diciembre, cuatro el 15 de diciembre y tres del 3 al 26 de enero de 1998 (L. J. Salaverri, F. Barrera, F. J. Fdez. Otero, A. Glez. Redondo y P. Rguez. Rivas). En la vecina ría del Eo (Lugo/Asturias) un ave el 4 de enero de 1998, quizás movida desde la ría de Foz (L. J. Salaverri).

Silbón Europeo*Anas penelope*

Canarias. En Fuerteventura, en el embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, una hembra el 12 de octubre de 1992 (R. Barone y M. Siverio) y otro ej. el 29 de diciembre de 1996 (M. Pettersen y S. Iversby). En La Palma, macho en eclipse en un estanque de Tazacorte el 19 de octubre de 1996 (R. Barone y D. Trujillo).

Ánade Rabudo*Anas acuta*

Canarias. Observaciones en las Canarias orientales, donde hay pocas citas: en Lanzarote, macho en eclipse en las salinas de Los Cocoteros, Tegui, el 1 de octubre de 1995 (J. A. Lorenzo, J. C. Rando y M. López); en Fuerteventura, en charca de riego al sur de Tesejerague, Tuineje, un ej. el 20 de marzo de 1992 (S. Scholz).

Cerceta Pardilla*Mamaronetta angustirostris*

Durante la estación de reproducción de 1997 se observan 18 pollos —de cinco polladas diferentes— en La Cañada de Las Norias (Almería) entre el 19 de junio y el 28 de julio de 1997 (M. Paracuellos). Otras observaciones en Almería, año 1997: ej. en las albuferas de Adra el 9 de abril, y en las salinas de Cabo

de Gata, cinco el 26 de agosto y cuatro el 2 de septiembre (M. Paracuellos).

Pato Colorado*Netta rufina*

Concentración de más de 5.000 aves en mancada en el embalse del Ebro (Burgos) el 16 de julio de 1994 (J. Román Sancho).

Porrón Europeo*Aythya ferina*

En el embalse de Monteagudo de Las Vicarías (Soria), hasta seis machos y seis hembras el 24 de junio de 1991 (J. Román Sancho).

Porrón Pardo*Aythya nyroca*

Dos aves en la desembocadura del río Antas (Almería) el 22 de diciembre de 1996, que permanecen al menos hasta el 28 de febrero de 1997, fecha en que se observan tres ejes. —dos machos y una hembra— (J. P. Enciso y M. de Lara). En la provincia de Lleida, 1997, dos machos en una balsa de riego en Alcarràs el 9 de noviembre (J. Solans y S. West) y una hembra en el embalse de Utxesa el 11 del mismo mes (S. West).

Porrón Bastardo*Aythya marila*

Una hembra en el embalse de Requejada (Palencia) el 28 de diciembre de 1989 (J. Román) y un macho en el embalse del Ebro (Burgos) el 14 de enero de 1990 (F. Jubete y J. Román). Ya en 1997, hembra ad. en balsa de riego de Alcarràs (Lleida) el 8 de noviembre (J. Solans, J. Bota y S. West), dos hembras en la ría de Ortigueira (A. Coruña) el 2 de diciembre (L. J. Salaverri) y tres hembras en la misma localidad el 12 de diciembre (A. Gutiérrez Pita y P. Gutiérrez Varga), y un macho en O Grove (Pontevedra) el 14 de diciembre (A. Gutiérrez Pita y P. Gutiérrez Varga).

Porrón Osculado*Bucephala clangula*

En diciembre de 1997, en la provincia de A Coruña, inm. en Valdoviño a lo largo del mes y dos hembras en Doñiños el día 12 (A. Gutiérrez Pita, P. Gutiérrez Varga y P. Pita Criado), y en la vecina provincia de Lugo, un macho inm. y una hembra en la ría de Foz, desde el día 3 y al menos hasta el 26 de enero de 1998 (L. J. Salaverri).

Eider Común*Somateria mollissima*

Un ave en las marismas de Santoña (Cantabria) el 1 de enero de 1997 (J. Román y F. Jubete).

Negrón Especulado*Melanitta fusca*

Doas aves salen volando del puerto-refugio de Hondarribia (Guipúzcoa) el 30 de diciembre de 1996 (D. Calleja). Tres machos y dos hembras junto a la desembocadura del río Almanzora (Almería) el 8 de enero de 1997, en compañía de Negrones Comunes y Alcas (J. P. Enciso y M. de Lara).

Malvasía Cabeciblanca

Oxyura leucocephala

En 1997, al menos 118 aves en la laguna del Gosque (Sevilla) el 25 de octubre (I. García Páez y A. Serrano Lavado); hembra en una balsa de riego ca. Atarfe (Granada) el 3 de diciembre (J. M. Glez. Cachinero), y ave en la laguna de Pétrola (Albacete) el 27 de diciembre (A. Gómez Gómez). También en 1997, en Almería: en las salinas de Guardias Viejas, una hembra entre el 5 y el 25 de enero de 1997, un macho y una hembra el 14 de enero, y cuatro machos y dos hembras los días 26 y 27 de enero (M. Paracuellos), y en la charca de Matagorda, macho y hembra el 21 de junio (J. A. Peña y M. Paracuellos).

Reproducción en Málaga: hembra con tres pollos en la laguna de Capacete, Campillos, el 7 de agosto de 1997 (F. Cabello de Alba).

Elanio Común

Elanus caeruleus

Ave ad. en Ardoncino (León) el 24 de mayo de 1995 (J. Román Sancho). Otro ad. en un área de repoblación de pino silvestre y brezales en el concello de A Veiga (Ourense) el 25 de marzo de 1997 (F. Moran y D. Taín). Hasta siete pp. en zona de dehesas entre los embalses de Los Canchales y Morante (Badajoz) el 20 de abril de 1997, cuando en 1996 sólo se observó una (A. Pérez-Acevedo).

Milano Negro

Milvus migrans

En invierno, un ave en compañía de Milanos Reales en el basurero de Medina del Campo (Valladolid) el 11 de enero de 1998 (A. Tores, J. Colás y M. Carbajo / SEO-Valladolid).

Milano Real

Milvus milvus

Un ave permanece en Ceuta, en la zona del monte Hacho, entre agosto de 1996 y enero de 1998, alimentándose de aves de corral y desperdicios de granjas cercanas (J. Navarrete y J. Jiménez / SEO-Ceuta). En Galicia, un ave en A Xesta, Abadín (Lugo) el 29 de septiembre de 1996 (L. J. Salaverri). Corrección: la cita de un ave sobre Mondoñedo (Lugo) en octubre de 1996 (Ardeola, 44: 249) no se debe a L. J. Salaverri.

Alimoche Común

Neophron percnopterus

Observación en época de reproducción en el norte de Lugo: ad. vuela hacia NO en el monte Neda, Aba-

dín, el 1 de mayo de 1997 (L. J. Salaverri, F. Barrera y F. J. Fdez. Otero).

Canarias. En Tenerife, quizás uno de los últimos antes de su extinción en la isla: ad. en los altos de Chío. Gufa de Isora, el 26 de febrero de 1989 (M. Siverio).

Buitre Leonado

Gyps fulvus

Observación primaveral en Galicia, donde la especie no se reproduce: tres aves a gran altura en Muras (Lugo) el 24 de mayo de 1997 (L. J. Salaverri, G. Martínez, F. Barrera y A. Martínez).

Culebrera Europea

Circetus gallicus

Observación tardía en Ceuta: dos aves los días 16 y 17 de noviembre de 1996, volando hacia el O en el arroyo Benítez (D. Berral).

Aguilucho Cenizo

Circus pygargus

Canarias. En Tenerife, macho ad. en llanos ca. parque eólico de Granadilla de Abona el 3 de abril de 1997 (R. Barone y J. M. Moreno) y hembra ad. en cultivos de Los Rodeos, La Laguna, el 25 de octubre de 1997 (R. García).

Aguililla Calzada

Hieraaetus pennatus

Canarias. En La Palma, ej. de morfo claro sobrevolando La Laguna de Barlovento, Barlovento, el 23 de septiembre de 1997 (R. García).

Águila Pescadora

Pandion haliaetus

En época estival, ave en las salinas de La Tapa, El Puerto de Santa María (Cádiz) el 7 de julio de 1994 (D. Berral).

Canarias. En Tenerife, durante la primavera de 1997 crían tres pp. en el macizo de Teno, donde el 10 de mayo se ve una en compañía de un pollo volandero, y entre el 15 y 25 de junio, las dos restantes con dos pollos volanderos cada una (M. Siverio y J. J. Ramos).

Cernícalo Primilla

Falco naumanni

Censos provinciales en Málaga: en 1994, 151-187 pp. reproductoras; en 1996, 156-193 pp. (censos de SILVEMA, coordinados por A. L. Pérez).

Diferentes observaciones en los páramos del norte de la provincia de Burgos en período postreproductor, durante los años 1990 a 1995, entre las que destacan 30 aves en Torrecitores el 8 de septiembre de 1990, 20 en Masa el 12 de septiembre de 1992, y 58 entre Cernégula y Pesadas de Burgos el 29 de julio de 1995 (J. Román Sancho).

Alcotán Europeo*Falco subbuteo*

Canarias. En Tenerife, subad. en las inmediaciones de la balsa de La Cruz Santa, Los Realejos, el 16 de septiembre de 1995 (M. Siverio, D. Trujillo y R. Barone).

Polluela Pintoja*Porzana porzana*

Individuo come a orillas del arroyo de La Matallana, Canencia (Madrid), el 22 de marzo de 1997 (A. Gil Frías e I. Rodríguez / AGF). Dos aves en la desembocadura del río Antas (Almería) los días 23 de marzo y 14 de abril de 1997 (J. P. Enciso y M. de Lara).

Polluela Bastarda*Porzana parva*

Un ave a orillas de una balsa de las salinas de Roquetas de Mar (Almería) el 29 de diciembre de 1997 (L. García Román y J. C. Garrido / SEO-Alectoris).

Polluela Chica*Porzana pusilla*

Ave en balsa de riego de Alcarràs (Lleida) el 12 de mayo de 1997 (S. West).

Guión de Codornices*Crex crex*

Se levantada con perro un ave en zona de barbechos y viñas abandonadas junto al embalse de Campañana, Carucedo (León), entre los días 19 y 23 de octubre de 1993 (A. Fdez. Pacios).

Calamón Común*Porphyrio porphyrio*

Ave en las albuferas de Adra (Almería) el 12 de noviembre de 1997 (M. Paracuellos). En la provincia de Málaga, el 21 de febrero de 1998, ocho aves en la laguna Dulce de Campillos y 10 en una pequeña laguna junto al centro de recepción de Fuentedepiedra (SEO-Granada).

Focha Común*Fulica atra*

Cifra importante en el embalse de Monteagudo de las Vicarías (Soria) en período reproductor: 746 aves el 24 de junio de 1991 (J. Román Sancho).

Canarias. En Tenerife, en la presa Vieja de Armeñime, Adeje, el 19 de marzo de 1997 hay dos pp. nidificantes y el 21 de julio, cuatro ads. y siete juvs. (al parecer, ya en 1996 una pareja crió en este lugar) (J. J. Ramos y D. Trujillo).

Focha Moruna*Fulica cristata*

Ave ad. en la laguna Dulce de Campillos (Málaga) los días 19 y 25 de octubre de 1997, en compañía de gran número de Fochas Comunes (I. García Páez, F. Cabello de Alba, M. C. Reina y A. Serrano).

Grulla Común*Grus grus*

Observaciones en invierno junto a Pétrola (Albacete): en Casa Gualda, seis o siete ejes. el 26 de diciembre de 1990, y en la propia laguna de Pétrola, tres el 30 de noviembre de 1991 y otros tres el 2 de enero de 1993 (A. Gómez Gómez). En las salinas del Cabo de Gata (Almería) dos aves el 30 de octubre de 1997 y seis el 12 de diciembre del mismo año (M. Paracuellos).

Ostrero Euroasiático*Haematopus ostralegus*

Canarias. En Tenerife, ej. en la costa de Los Silos entre el 19 y el 27 de octubre de 1991 (D. García y R. García).

Cigüeñuela Común*Himantopus himantopus*

Canarias. Primeros datos de cría para Lanzarote: en las salinas de Janubio, Yaiza, el 12 de mayo de 1996 se observan cinco nidos y al menos dos pp. con pollos de corta edad; en años anteriores ya había en la zona aves querenciosas que podrían haber nidificado (J. A. Lorenzo).

Avoceta Común*Recurvirostra avosetta*

Observaciones invernales en el norte, enero de 1997: 39 aves en la ría de Eo (Lugo) el día 4 (L. J. Salaverri, F. Barrera y F. J. Fdez. Otero); 10 en la bahía de Txingudi (Guipúzcoa) del 2 al 4 (D. Calleja y M. Guereñu), y dos en gravera de Sant Boi (Barcelona) el día 12 (A. Salmerón).

Corredor Sahariano*Cursorius cursor*

Canarias. Primera cita en el islote de Alegranza: restos de un ej. el 28 de abril de 1997 (V. Quilis y M. Nogales). Divagantes en Tenerife: en llano ca. El Fraile, Arona, ad. el 16 de marzo de 1989 (R. Barone), y en las inmediaciones de la montaña Aguzada, Arona, un ej. el día 18 y tres el 23 de junio de 1995 (J. A. Lorenzo y J. González).

Canastera Común*Glareola pratincola*

Canarias. En Gran Canaria, tres ejes. en terrenos ca. costa de Arinaga, Agüimes, el 14 de mayo de 1991 (R. Barone y D. Trujillo).

Chorlitejo Patinegro*Charadrius alexandrinus*

Canarias. En La Palma, tres ads. en las salinas de Fuencaliente el 27 de septiembre de 1995 (M. Fdez. del Castillo).

Chorlito Carambolo*Charadrius morinellus*

Ave ad. en zona elevada de la sierra de Béjar (Canchal Negro, 2.350 m s.n.m.) en el término de Candelario (Salamanca), el 16 de noviembre de 1997 (J. J. Ramos Encalado).

Chorlito Gris

Pluvialis squatarola

Cuatro aves en parcela inundada de cultivo de arroz en Palazuelo (Badajoz) los días 22 y 23 de noviembre de 1997 (J. L. Pérez Chiscano).

Avefría Europea

Vanellus vanellus

Observación estival en Guipúzcoa, donde la especie no se reproduce: dos aves en la ribera de Jai-zubía, bahía de Txingudi, el 2 de julio de 1997 (D. Calleja y M. Guereñu).

Correlimos de Temminck

Calidris temminckii

En Almería, marzo de 1997, un ave en las salinas de Cerrillos el día 6 y otra en La Cañada de Las Norias el día 7 (M. Paracuellos).

Correlimos Zarapitín

Calidris ferruginea

En invierno, individuo en arrozales inundados ca. Torviscal (Badajoz) el 7 de diciembre de 1997 (J. L. Pérez Chiscano).

Canarias. En La Palma (Canarias), cuatro aves en las salinas de Fuencaliente el 27 de septiembre de 1995 (M. Fdez. del Castillo).

Correlimos Oscuro

Calidris maritima

Ave en rocas junto a la playa de Punta Secreta, Algeciras (Cádiz), el 22 de noviembre de 1997 (F. Chiclana y J. A. Lama).

Combatiente

Philomachus pugnax

Canarias. Primera cita para El Hierro: macho juv. en una balsa de El Golfo, Frontera, los días 17 y 19 de septiembre de 1996 (D. Trujillo y C. González).

Agachadiza Común

Gallinago gallinago

Canarias. En La Gomera, ej. en el barranco de La Villa, San Sebastián, el 29 de marzo de 1992 (K. W. Emmerson y R. Barone). En La Palma, ej. en graveras junto al aeropuerto el 22 de septiembre de 1997 (R. García).

Falaropo Picofino

Phalaropus lobatus

Un ej. en plumaje inv. en la laguna de Camposoto, San Fernando (Cádiz), los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 1996 (E. Muñoz Charro). En Almería, sendas aves en las salinas de Cabo de Gata el 22 de

noviembre de 1996 y el 1 de abril de 1997, y una más en las salinas de Cerrillos el 31 de octubre de 1997 (M. Paracuellos).

Falaropo Pico grueso

Phalaropus fulicarius

Individuo en las salinas Aragonesas, marismas del Odiel (Huelva), el 27 de diciembre de 1997 (J. I. García-Abasolo). Dos ej. en la laguna de Medina, Jerez de la Frontera (Cádiz), el 27 de diciembre de 1997 (E. Muñoz Charro).

Págalo Pomarino

Stercorarius pomarinus

Un ave de morfo claro frente a El Lance de la Virgen, Adra (Almería), el 29 de noviembre de 1997 (M. Paracuellos).

Gaviota Enana

Larus minutus

En invierno, ad. en la desembocadura del río Antas (Almería) los días 3 y 5 de febrero de 1997 (J. P. Enciso y M. de Lara), y en La Caleta, ciudad de Cádiz (Cádiz) dos ads. el día 18 y un 1er. inv. el 30 de diciembre de 1997 (E. Muñoz Charro).

Canarias. En Tenerife, ad. en charca de riego en El Fraile y en la costa del Malpaís de Rasca, Arona, el 4 de mayo de 1990 (R. Barone y P. Martínez).

Gaviota de Sabine

Larus sabini

En 1997: tres ads. 25 millas al norte de Gijón (Asturias) el 18 de agosto (R. Armada, G. Bota, X. Larroy, A. Nieves y S. West); siete ej. pasan hacia O muy cerca de la costa frente al cabo Higuier, Hondarribia (Guipúzcoa), el 12 de octubre (D. Calleja y M. Guereñu); un 1er. inv. en La Caleta, ciudad de Cádiz (Cádiz) el 9 de noviembre (E. Muñoz Charro y F. Solís) y un ad. en el P. Nac. de Doñana (Huelva) el 26 de noviembre (J. A. Eyre).

Gaviota Pico fina

Larus genei

Observaciones en Almería a lo largo de 1997: ave en las salinas de Cabo de Gata los días 20 y 28 de febrero, 4 de marzo y 1 de abril; dos aves en la misma localidad el 10 de septiembre; una en las salinas de Cerrillos el 27 de febrero y los días 16 y 30 de mayo; una en Los Charcones de Punta Entinas-Sabinar el 18 de junio, y una más en las salinas de Guardias Viejas el 17 de julio (M. Paracuellos). Grupo de 17 ej. —11 ads. y 6 subads.— en las salinas de La Tapa, Puerto de Santa María (Cádiz), el 4 de enero de 1998 (E. Muñoz Charro).

Gaviota de Audouin

Larus audouinii

Concentración de 203 aves en las salinas de Tres Amigos, San Fernando (Cádiz), el 6 de octubre de 1997 (E. Muñoz Charro y D. Agüera).

Gaviota Patiamarilla*Larus cachinnans*

Primer dato de nidificación en la ciudad de Santander (Cantabria): en 1997, una pareja se instala en un tejado en ruinas en pleno centro de la ciudad y saca adelante tres pollos, que vuelan el 17 de julio; además, se ven y escuchan individuos defendiendo territorios en otros puntos de la ciudad (A. Herrero Calva y A. García García).

Gavión Atlántico*Larus marinus*

Observación en el interior: ave de 3.ª o 4.ª inv. en el embalse de El Pintado, Cazalla de la Sierra (Sevilla), el 23 de noviembre de 1997 (M. C. Pérez Gómez).

Gaviota Tridáctila*Rissa tridactyla*

Observación en Almería, donde se considera invernante excepcional: siete aves frente a El Lance de la Virgen, Adra, el 29 de noviembre de 1997 (M. Paracuellos). En Cádiz, diciembre de 1997: un 1er. inv. recogido en la playa de Levante, Puerto Real, el día 10; cinco aves, todas 1er. inv., en la propia ciudad de Cádiz el día 18 (en La Caleta, con fuerte temporal), y ad. recogido en el mismo sitio el día 22 (E. Muñoz Charro).

Pagaza Piconegra*Gelochelidon nilotica*

Observación de 21 aves en época reproductora en el embalse de Monteagudo de las Vicarías (Soria), el 24 de junio de 1991 (J. Román).

Pagaza Piquirroja*Sterna caspia*

Observación estival: en las salinas de La Tapa, El Puerto de Santa María (Cádiz), cinco aves el 29 de julio de 1993 (D. Berral). En paso, en la costa de Almería, dos aves frente a la isla de Terreros el 6 de abril y otras dos en la desembocadura del río Antas el 22 de agosto de 1997 (J. P. Enciso y M. de Lara).

Charrán Bengalí*Sterna bengalensis*

En las Baleares, ave en plumaje estival, observada y fotografiada en la albufera de Mallorca el 16 de agosto de 1997 (A. Stagg, comunicado por Parc Natural de S'Albufera). Dos aves en la desembocadura del Guadalhorce (Málaga) el 9 de noviembre de 1997 (J. A. Sencianes).

Charrán Patinegro*Sterna sandvicensis*

Concentración de 130 aves en la costa de Benjú, Ceuta, el 28 de enero de 1996 (D. Berral).

Charrán Rosado*Sterna dougallii*

Dos juvs. a seis millas al norte de Gijón (Asturias) el 18 de agosto de 1997 (R. Armada, G. Bota, X. Larruy, A. Nievas y S. West). Ave ad. en migración en la playa de Razo-Baldaio, Carballo (A. Coruña), el 24 de septiembre de 1997 (A. Pombo).

Charrán Común*Sterna hirundo*

En el puerto de Camargo, bahía de Santander (Cantabria), donde una pareja nidifica desde 1990, se instala en 1997 una pequeña colonia constituida por cinco pp.: el 11 de junio se observa en la cubierta de un barco semihundido un pollo que está siendo alimentado por ads., y durante el mes de julio se localizan cuatro pp. más sobre una barcaza, dos con pollos y dos que incuban; a finales de julio la barcaza fue trasladada al puerto de Bilbao, sin que se sepa cuántos pollos llegaron a volar (A. Herrero Calva, A. García García y J. Aja).

Canarias. En el islote de Lobos, Fuerteventura, tres aves alarmadas ante observadores —entre El Puertito y la punta de El Marrajo— el 20 de mayo de 1994; además, se supo que en años anteriores crió una pareja en un jable al noroeste y otra ca. playa de La Calera (R. Barone, L. Becherucci y S. Benucci).

Charrancito Común*Sterna albifrons*

Canarias. Primera cita para Gran Canaria: ej. en la costa de Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, el 22 de abril de 1994 (M. Siverio y E. Oñate).

Fumarel Común*Chlidonias niger*

En la playa de Levante, El Puerto de Santa María (Cádiz), reposan 41 ej. el 5 de julio de 1994 (D. Berral).

Canarias. En Gran Canaria, ad. en la playa de los Tártagos el 14 de mayo de 1991 y al día siguiente, otro o quizás el mismo en la charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana (R. Barone y D. Trujillo).

Fumarel Aliblanco*Chlidonias leucopterus*

En Almería, 1997, ej. en las salinas de Cerrillos (Almería) el 1 de mayo y otro en La Cañada de Las Norias el 29 de agosto (M. Paracuellos).

Fraillecillo Atlántico*Fratercula arctica*

En el interior del puerto pesquero de Roquetas de Mar (Almería) ej. observado a muy corta distancia el 9 de abril de 1998 (P. Romero).

Tórtola Turca*Streptopelia decaocto*

Reproducción en la ciudad de Albacete: en el parque de Abelardo Sánchez, varias pp. el 30 de di-

ciembre de 1996, muchas el 29 de diciembre de 1997 —además de en otros puntos de la ciudad y sus afueras— y al menos 20 pp. el 8 de marzo de 1998 —varios individuos construyen nidos y se ve ad. con dos volantones (A. Gómez Gómez).

Canarias. En Lanzarote, ej. en Tinajo el día 21 y al menos cuatro en Arrecife el 26 de mayo de 1997 (A. Vidal). Situación en Tenerife: en Puerto de la Cruz hay citas desde el 20 de julio de 1992 —se constató la cría en enero de 1994— y en la actualidad hay más de un centenar de pp. —el 3 de octubre de 1997 se cuentan, en la zona de La Paz, alrededor de 100 aves; en La Orotava, se han visto individuos en Los Peralitos desde el 14 de julio de 1994 y ahora se observan en la ciudad de La Orotava; en Los Gigantes, Santiago del Teide, dos aves en octubre de 1996 y dos ads. y un juv. el 19 de marzo de 1997; en El Fraile, Arona, varios individuos —incluyendo un juv.— el 11 de noviembre de 1995, y hasta cinco ejs. y un nido en diciembre; en Candelaria, un ave el 29 de junio de 1995 y varias —incluyendo una en cortejo— el 26 de marzo de 1997; en Los Cristianos, Arona, ad. y subad. el 29 de marzo de 1997 (D. Trujillo y J. J. Ramos).

Cotorra de Kramer

Psittacula krameri

En 1997, ave junto a las salinas de Cerrillos (Almería) del 27 al 29 de enero (M. Paracuellos) y otra en las salinas de Calpe (Alicante) el 15 de septiembre (J. M. Herranz y L. M. Herranz).

Críalo

Clamator glandarius

Ave en vegetación dunar de la Punta del Sabinar (Almería) el 18 de julio de 1997 (M. Paracuellos).

Lechuza Común

Tyto alba

Reproducción en invierno: el 7 de enero de 1998 se recoge un pollo en la ciudad de Huesca; dada su edad, la puesta se debió realizar a primeros de noviembre (J. López Pardo).

Autillo

Otus scops

Ave canta en pinar de repoblación en el barranco de La Hoz, en sierra Espuña, término de Mula (Murcia), el 17 de febrero de 1998 (J. E. Mtnéz. Torrecillas y M. Carrete).

Chotacabras Pardo

Caprimulgus ruficollis

Cita invernal: ave canta en bosque de *Pinus halepensis* en la sierra de Lavia (Murcia) el 17 de enero de 1998 (M. Cremades y J. E. Mtnéz. Torrecillas).

Vencejo Pálido

Apus pallidus

Canarias. Nueva localidad de cría en Tenerife: cueva de Santa Lucía, Gúímar, donde, en el seno de una colonia de Vencejo Unicolor, el 7 de junio de 1996 entran dos ads. en grietas, se escucha otro ej. en el interior de una oquedad y se hallan cáscaras de un huevo, mientras el 18 de mayo de 1997 se observan dos aves entrando en otras grietas y parte de un nido (D. Trujillo, R. Barone y C. J. Palacios). Observaciones en La Gomera: en el vertedero de Abalo, San Sebastián, dos aves del 3 al 5 de junio de 1992 (D. Trujillo); en acantilados costeros ca. cementario de Playa Santiago, Alajeró, ej. el 27 de julio de 1996 (R. Barone y M. Siverio); en las inmediaciones de Alajeró, cuatro aves el 10 de febrero de 1997 y una el 28 de junio de 1997 (D. Trujillo y J. J. Ramos); ca. Tecina Alta, San Sebastián, ej. el 11 de febrero de 1997 (D. Trujillo y J. J. Ramos).

Vencejo Real

Apus melba

Observación tardía: ej. en el monte Hacho, Ceuta, el 20 de noviembre de 1993 (D. Berral).

Vencejo Cafre

Apus caffer

Observaciones en Ceuta, de sendos ejs. los días 4 de octubre de 1985 y 7 de noviembre de 1994 (D. Berral).

Carraca

Coracias garrulus

Ave en Orellán (León) del 1 al 15 de agosto de 1995 (A. Fdez. Pacios).

Torcecuello

Jynx torquilla

Canarias. En Tenerife, individuo en Erjos, Los Silos, el 16 de abril de 1994 (M. Siverio).

Pito Negro

Dryocopus martius

Un ave tamborilea y grita en un extenso hayedo-robleal de Altube (Álava) los días 15 y 21 de febrero de 1998, a sólo 380 m s.n.m. (J. M. Fdez. García y N. Ruiz de Azúa / Instituto Alavés de la Naturaleza).

Pico Menor

Dendrocopos minor

Nuevas observaciones, en diciembre de 1997, aumentan el área de distribución en la provincia de Salamanca: hembra en Ledesma el día 7, en dehesa de quejigos, y macho en Fuenterroble de Salvatierra el día 8, en zona de monte con melojos (M. López y J. J. Ramos Encalado / SEO-Salamanca). En la vecina provincia de Zamora, macho ad. en dehesas de roble y encina en Viñuela de Sayago, el 10 de noviembre de 1996 (M. A. García Matellanes y J. A. Hernández Rguez.).

Terrera Común*Calandrella brachydactyla*

Canarias. En Tenerife, hasta 60 individuos en Guargacho, San Miguel, el 9 de marzo de 1997 (R. Barone y J. M. Moreno).

Bisbita Gorgirrojo*Anthus cervinus*

Un ad. capturado para anillamiento en la isla de Tourís, O Grove (Pontevedra), el 18 de octubre de 1992 (V. X. Cabaleiro, F. Docampo y D. Taín). Ave de 1er. inv. en arrozales de Torres de Segre (Lleida) el 14 de octubre de 1997 (G. Bota y S. West).

Canarias. En Gran Canaria, dos aves en el campo de golf de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el 30 de octubre de 1996 (D. Trujillo y R. Barone).

Lavandera Boyera*Motacilla flava*

Observación invernal en Cataluña: ave en gravera de Sant Boi (Barcelona) el 15 de diciembre de 1996 (A. Salmerón).

Pechiazul*Luscinia svecica*

Canarias. En Tenerife, macho en Piedra Hincada, Guía de Isora, el 11 de marzo de 1997 (K.W. Emmerman y R. M. Walker).

Buscarla Pintoja*Locustella naevia*

Individuo canta junto a la laguna de Cospeito (Lugo) entre los días 16 y 28 de mayo de 1997 (L. J. Salaverri y G. Mtnz. Lamas).

Carricerín Común*Acrocephalus schoenobaenus*

Canarias. En Tenerife, ej. en Piedra Hincada, Guía de Isora, el 11 de marzo de 1997 (K. W. Emmerman y R. M. Walker). En charca de riego entre Tejina y Bajamar, La Laguna, hasta cinco individuos del 5 al 26 de marzo de 1997 (E. García del Rey y D. Sánchez / Aves Ecotours).

Carricero Común*Acrocephalus scirpaceus*

Canarias. En Tenerife, ej. en jardines del Puerto de la Cruz el 30 de marzo de 1995 (D. Trujillo), y otro en charca de riego entre Tejina y Bajamar, La Laguna, el 22 de octubre de 1995 (D. Trujillo, J. J. Ramos y T. Clarke).

Zarcero Pálido*Hippolais pallida*

Canarias. Corrección: la observación en *Ardeola* 43(2): 256 —en la punta de El Hidalgo, Tenerife— tuvo lugar en 1996.

Zarcero Icterino*Hippolais icterina*

Se captura para anillamiento un juv. en jardín de Mourente-Pontevedra (Pontevedra) el 9 de septiembre de 1997 (V. X. Cabaleiro).

Curruca Cabecinegra*Sylvia melanocephala*

Junto al P. Nat. Sierra de Grazalema (Cádiz) se encontró un pollo de Cuco muerto, que había engullido a la hembra de Curruca Cabecinegra cuyo nido parastaba (J. Tébar).

Papamoscas Cerrojillo*Ficedula hypoleuca*

Canarias. Primera observación en La Palma: dos aves en la Caldera de Taburiente el 28 de septiembre de 1995 (M. Fdez. del Castillo).

Carbonero Garrapinos*Parus ater*

En Ceuta, ej. capturado para anillamiento el 30 de septiembre de 1995 (D. Berral y J. Marín).

Oropéndola*Oriolus oriolus*

Corrección: la cita de invernada en Madrid en *Ardeola*, 44: 259, corresponde a L. M. Fdez. Herranz.

Canarias. Observaciones en Tenerife: en el barranco de Aguas de Dios o de Milán, La Laguna/Tejuna, ej. el 11 de mayo de 1985 (D. Trujillo y R. Barone), pareja el 1 de mayo de 1997, y un macho y dos hembras el 22 de mayo de 1997 (C. J. Palacios, M. Fdez. del Castillo y R. García); además, en fecha invernal, 22 de diciembre de 1985, ej. en laurisilva de Anaga, Santa Cruz de Tenerife (D. Trujillo y R. Barone).

Alcaudón Real*Lanius excubitor*

Canarias. Observación en Tenerife: en Teno Bajo, Buenavista del Norte, donde a fines del siglo pasado se consideró abundante pero no hay citas recientes, ej. el 12 de febrero de 1991 (R. Barone y F. Siverio).

Chova Piquigualda*Pyrhocorax graculus*

Observación muy lejos de áreas de cría: seis aves vuelan junto a la N-323, a pocos kms. al SE de la ciudad de Jaén, el 23 de febrero de 1998 (S. Boelsma).

Cuervo*Corvus corax*

Unas 300 aves duermen en una chopera, cerca de un muladar, en Quintanilla del Agua (Burgos) el 8 de agosto de 1992 (J. Román Sancho).

Gorrion Común*Passer domesticus*

Canarias. Primeros datos de presencia y reproducción: en el puerto de Las Palmas de Gran Cana-

ria, una pareja aporta material a un nido el 13 de marzo de 1998, y tres días más tarde, hay tres o cuatro pp. en el lugar y cerca, una colonia con unas 20 pp. El emplazamiento de este núcleo reproductor hace pensar en llegada asistida, por medio de barco, años atrás (T. Clarke y F. del Campo Ruiz).

Gorrión Moruno

Passer hispaniolensis

Primeros datos de reproducción en la provincia de Burgos: colonia de 12 nidos en una chopera de Cuevas de San Clemente durante el verano de 1995 y otra, de seis nidos, en Mecerreyes el 20 de julio de 1996 (J. Román Sancho y F. Román Sancho). También, primer dato de cría para Zamora: en una zona de dehesas de Viñuela de Sayago, el 15 de abril de 1997 se visita colonia de unos 300 nidos, repartidos entre cinco quejigos (*Quercus faginea*); esta colonia se había descubierto el mes de noviembre anterior, pero entonces los nidos no estaban ocupados, y según un informante local podría contar con una antigüedad de hasta cinco años (M. A. García Matellanes y J. A. Hernández Rguez.).

Gorrión Chillón

Petronia petronia

Canarias. En Tenerife, al menos tres aves crían en viviendas en construcción en Llano del Moro. El Rosario, el 2 de junio de 1993, y dos o tres ejes. en unas construcciones en Santa María del Mar. Santa Cruz de Tenerife, en abril y mayo de 1997 (R. Barone y K.W. Emmerson).

Euplectes hordeacea

Un macho, posiblemente escapado, en La Cañada de las Norias (Almería) los días 24 y 28 de julio de 1997 (M. Paracuellos).

Bengalí Rojo

Amandava amandava

Reproducción comprobada en Vizcaya: en el humedal Vega de Astrabudua, Erandio, una pareja desde la primavera de 1996 —cuando saca tres pollos— hasta enero de 1998 (J. Zuberogoitia, A. Ramos e I. Zuberogoitia).

En Las Herencias (Toledo), en el embalse de Azután, cuatro machos y dos hembras el 31 de agosto de 1997, y hasta 12 individuos, muy activos entre los carrizos y espadañas, el 20 de septiembre siguiente (Grupo Ardeidas).

Pico de Coral

Estrilda astrild

Reproducción en el humedal Vega de Astrabudua, Erandio (Vizcaya): pareja alimenta dos pollos voladeros en agosto de 1996 (J. Zuberogoitia, A. Ramos e I. Zuberogoitia). En el interior de la localidad de Montijo (Badajoz), un nido en un carrizo de las Pampas (*Gynerium argenteum*) situado en un jar-

dín, que está en construcción el 2 de septiembre de 1996 y junto al que, el 9 de octubre, se observan cinco ads. y cuatro juvs. (A. Pérez Acebedo).

Carita de Naranja

Estrilda melpoda

Reproducción posible en el humedal Vega de Astrabudua, Erandio (Vizcaya), donde se observan individuos desde el invierno de 1995 hasta el verano de 1996 (J. Zuberogoitia, A. Ramos e I. Zuberogoitia). Un ej. capturado para anillamiento junto al río Jarama en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) el 15 de mayo de 1997 —el 6 de abril se habían visto dos (J. Pinilla y J. Pérez Tris; determinación confirmada por el Comité de Rarezas).

Verdecillo

Serinus serinus

Canarias. En La Palma, macho en Triana, Los Llanos de Aridane/El Paso, el 19 de octubre de 1996 (D. Trujillo y R. Barone).

Verderón Común

Carduelis chloris

Canarias. En La Gomera, macho canta junto a El Cercado, Vallehermoso, el 26 de julio de 1995 (D. Trujillo), y otro en Los Aceviños, Hermigua, el 11 de febrero de 1997 (D. Trujillo y J. J. Ramos). En El Hierro, ad. y juv. en Entremontañas, ca. San Andrés, Valverde, el 29 de julio de 1991 (D. Trujillo).

Jilguero

Carduelis carduelis

Canarias. En Lanzarote, ad. canta en Santa Coloma, Arrecife, en agosto de 1988, y hay una decena de aves junto al campo de golf de Tegui del 22 de octubre al 30 de noviembre de 1992 (D. Trujillo). En El Hierro —donde las últimas referencias datan de fines del siglo pasado— dos aves en las cercanías de Las Montañetas, Valverde, el 30 de julio de 1983 (K. W. Emmerson), un ej. en Frontera el 22 de julio de 1986 (M. Nogales) y otro ca. El Garoé, Valverde, el 18 de septiembre de 1996 (D. Trujillo y C. González).

Lúgano

Carduelis spinus

Canarias. En Tenerife, ej. en La Maleza, Buenavista del Norte, los días 2 y 3 de noviembre de 1996 (B. Rguez. Martín).

Piquituerto Común

Loxia curvirostra

En Ceuta, en el arroyo de Calamocarro, dos machos y cinco hembras el 24 de octubre de 1993 (D. Berral).

Camachuelo Común

Pyrrhula pyrrhula

Observación estival en Extremadura: individuo can-

ta en el P. Nat. Monfragüe (Cáceres), ca. portilla del Tiétar, el 7 de julio de 1997 (J. A. Ojalvo y J. M. Herranz). En invierno, en el sur: un macho en Ceuta, que se anilla en el arroyo de Calamocarro el 17 de diciembre de 1994 (D. Berral, J. Marín y J. M. Luque), y otro macho en la ciudad de Sevilla, en el parque Amate, observado el 9 de enero de 1998 (A. Plata).

Picogordo

Coccythraustes coccythraustes

Captura para anillamiento de una hembra en Ceuta, en el arroyo de Calamocarro, el 29 de marzo de 1996 (D. Berral y J. Marín).

Escribano Nival

Plectrophenax nivalis

Macho en pastizal montano junto a la cumbre del monte Gorbea (Álava) a 1.400 m s.n.m., el 16 de marzo de 1998 (J. M. Fdez. García / Instituto Alavés de la Naturaleza).