

## OBSERVACIONES DE AVES RARAS EN ESPAÑA, AÑO 1999

Eduardo DE JUANA, A. \*  
y el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología

RESUMEN.—*Observaciones de aves raras en España, año 1999*. Informe número 16 del Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología. Presenta 181 registros nuevos correspondientes a 82 especies, con un porcentaje de aceptación del 82,9 %. Resultan particularmente destacables los primeros registros homologados en España de Garza Azulada *Ardea herodias* (observada en las islas Canarias), Focha Americana *Fulica americana* y Robín Americano *Turdus migratorius*, y los segundos de Cerceta de Alfanjes *Anas falcata* (ejemplar de origen desconocido) y Correlimos de Alaska *Calidris mauri*. Para las islas Canarias se presentan los primeros registros homologados de Barnacla Cariblanca *Branta leucopsis*, Tarro Blanco *Tadorna tadorna*, Porrón Bastardo *Aythya marila*, Águila-azor Perdicera *Hieraetus fasciatus* (dos aves, de origen desconocido), Gaviota de Audouin *Larus audouinii* y Gavión Hiperbóreo *Larus hyperboreus*, y para las Baleares, el primero de *Threskiornis aethiopicus* (origen desconocido).

SUMMARY.—*Report on rare birds in Spain in 1999*. This is the 16<sup>th</sup> annual report of the Spanish Ornithological Society's Rarities Committee. It presents 181 new records relating to 82 species, with an acceptance rate of 82.9 %. Species new to the Spanish list are Great Blue Heron *Ardea herodias* (recorded in the Canary islands), American Coot *Fulica americana* and American Robin *Turdus migratorius*. Second accepted records are included for Falcated Duck *Anas falcata* (bird of unknown origin) and Western Sandpiper *Calidris mauri*. For the Canary islands it presents the first accepted records of Barnacle Goose *Branta leucopsis*, Shelduck *Tadorna tadorna*, Scaup *Aythya marila*, Bonelli's Eagle *Hieraetus fasciatus* (two birds, of unknown origin), Audouin's Gull *Larus audouinii* and Glaucous Gull *Larus hyperboreus*, and for the Balearic islands the first one of Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus* (bird of unknown origin).

### INTRODUCCIÓN

Este informe hace el número 16 de los realizados por el Comité de Rarezas de SEO desde su fundación en 1984. En él se tratan 181 registros de aves raras en España, además de algunos otros que aparecieron ya en el informe de 1988 y se vuelven a considerar dado que afectan también al año 1999. Tienen que ver en total con 82 especies, 71 de ellas con algún registro homologado. Se homologan 150 registros y se rechazan 31, lo que supone un porcentaje de aceptación del 82,9 %.

También este año tenemos en el informe especies nuevas para la fauna española, en concreto tres de origen neártico, una observada en las Canarias, la Garza Azulada *Ardea herodias*, y dos registradas en el País Vasco, la Focha Americana *Fulica americana* y el Robín Americano *Turdus migratorius*. Se homologa también un primer registro de Bulbul Naranja

*Pycnonotus barbatus*, pero ya antiguo, de 1956, y de origen que pudiera no ser natural, y el que fue primer registro ibérico en orden cronológico de Avetoro Lentiginoso *Botaurus lentiginosus*, de 1961. Son segundas citas homologadas las que corresponden a la Cerceta de Alfanjes *Anas falcata* (un ejemplar de origen desconocido) y al Correlimos de Alaska *Calidris mauri*, y terceras las relativas a Albatros Ojeroso *Diomedea melanophris*, Paíño de Madeira *Oceanodroma castro*, Espátula Africana *Platalea alba* (de origen discutible), Chorlitejo Semipalmado *Charadrius semipalmatus*, Correlimos Menudillo *Calidris minutilla*, Abejaruco Papirrojo *Merops persicus* y Alcaudón Isabel *Lanius isabellinus*. En el ámbito de las islas Canarias tenemos las primeras citas homologadas de Barnacla Cariblanca *Branta leucopsis*, Tarro Blanco *Tadorna tadorna*, Porrón Bastardo *Aythya marila*, Águila-azor Perdicera *Hieraetus fasciatus* (dos aves, de origen descono-

\* Departamento de Biología Animal I. Facultad de Biología, 9.<sup>a</sup> planta. Universidad Complutense. E-28040 Madrid.

cido), Gaviota de Audouin *Larus audouinii* y Gavión Hiperbóreo *Larus hyperboreus*. En el de las Baleares, la primera cita homologada de *Threskiornis aethiopicus* (pero de origen desconocido). También son de especial interés una cita en Canarias de Porrón Bola *Aythya affinis* que afecta a un grupo de nada menos que ocho individuos, y una serie de observaciones de Buitre Moteado *Gyps rueppellii* en el área del Estrecho, en dos veranos consecutivos, que se refieren a un mínimo de ocho aves diferentes y sugieren movimientos naturales de la especie entre África y Europa.

Repiten un año más los vigentes miembros del Comité de Rarezas, es decir, David Bigas i Campas (Deltebre, Tarragona), José Ignacio Dies Jambriño (Valencia), Elías García Sánchez (Oviedo/Uvieu), Ricard Gutiérrez Benítez (Barcelona), Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez (La Laguna, Tenerife) y José Luis Rabuñal Patiño (A Coruña), así como su Secretario, Eduardo de Juana. Ayudó muy eficazmente Rosa Mary de Ayala Monedero.

Gracias, como siempre, a todos y cada uno de los observadores que tuvieron a bien remitir sus citas al Comité de Rarezas, y a todo el conjunto de la Sociedad Española de Ornitología, por su continuo apoyo.

#### LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTROS HOMOLOGADOS

La lista que sigue se ha elaborado de acuerdo con los siguientes criterios:

- En cada observación se consignan, por orden, 1) provincia; 2) localidad; 3) número de aves observadas (si no se indica otra cosa es una sola), 4) edad y sexo si se conocen (para datos primaverales-estivales sólo se expresa edad cuando no se trata de plumaje nupcial); 5) indicaciones en el caso de que el ave o aves hubieran sido cazadas, trapeadas o encontradas muertas, y si se conservan y dónde; asimismo, si existen fotografías entre la documentación en poder del Comité; 6) fecha(s); 7) observador(es), en general no más de tres.
- Se publican sólo datos considerados seguros, aunque también observaciones indeterminables a nivel específico en gé-

neros de gran dificultad como *Diomedea* (albatros) o *Limnodromus* (agujetas).

- Las cifras entre paréntesis dispuestas a continuación del nombre de la especie indican los registros/individuos homologados ya por el Comité para los conjuntos de España peninsular-islas Baleares (PB) y Canarias (C) en: 1) años anteriores a 1999; 2) año 1999 (sin incluir los registros de 1998-99 que ya aparecieron en el informe de 1998).
- De no mediar indicación en otro sentido las fechas se refieren todas a 1999.
- La secuencia taxonómica seguida es, salvo pequeñas modificaciones, la de Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic*, 1978).
- Un breve comentario sobre cada especie intenta situar las observaciones consideradas en relación a lo que se conoce sobre el estatus de la especie en España y a lo ya dicho en informes anteriores, indicando al principio, entre paréntesis, lo esencial del área de cría en el mundo.

La propiedad de los datos contenidos en el informe corresponde a los diferentes observadores, que deben ser citados como autores en la bibliografía.

#### 1) ESPECIES CONSIDERADAS RARAS EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA

##### **Zampullín Cuellirrojo**

*Podiceps auritus* (PB: 42/66, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Guipúzcoa.** Irún, bahía de Txingudi, 11 de enero (M. Estonba Mintxero).

##### **1996:**

**Asturias.** Gozón, embalse de La Granda, 12 de diciembre de 1995 a 25 de enero de 1996 (M.E. Carballal del Valle, F. de Miguel, C.M. Álvarez Laó, J.C. Vázquez Rodríguez, J.A. García Cañal, E. García Sánchez y otros / Coordinadora Ornitológica d'Asturies).

##### **1995:**

**Asturias.** Gozón, véase arriba. (Holártico boreal). Todavía se incluye una cita del excepcional invierno 95-96.

##### **Albatros Ojeroso**

*Diomedea melanophrys* (PB: 2/2, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**A Coruña.** Mar a 8 millas de la costa, 42°40' N / 09°12' W, ad., 18 de octubre (M. Quevedo).

(Mares del Sur). Tercera cita homologada. Las anteriores corresponden a Asturias, julio de 1984 y Pontevedra, diciembre de 1987 (*Ardeola*, 36: 113 y 37: 110).

#### **Pardela Chica**

*Puffinus assimilis* (PB: 5/5, 1/7; C: no se considera)

**Cantabria.** Desde el *ferry* entre Bilbao y Portsmouth, siete aves en el trancurso de una hora, con una a 45°17'N / 04°00'W, cuatro juntas a 45°30'N / 04°05'W y dos a 45°35'N / 04°07'W, 23 de agosto (T. Melling, T. Breerton y R. Neave).

(Mares subtropicales del Atlántico, Índico y Pacífico sur). No teníamos citas desde 1991 y ésta es la primera que tiene que ver con más de un ave. El área de observación se sitúa en el borde de la plataforma continental del Golfo de Vizcaya.

#### **Paíño de Wilson**

*Oceanites oceanicus* (PB: 6/37, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Pontevedra.** Mar frente a Vigo, a 22 millas de la costa, ejemplar recogido en cubierta y liberado a continuación, 16 de octubre (M. Quevedo).

#### **1997:**

**A Coruña.** Frente al cabo de Estaca de Bares, entre 10 y 20 millas mar afuera, al menos 20 individuos, hay fotografías, 14 de septiembre (J. Rodríguez Silvar y otros).

(Antártida e islas subantárticas). Ya van cinco registros en Galicia, por uno en Cantabria y otro en Andalucía. El de 1997 es el que hace referencia a un mayor número de aves hasta la fecha.

#### **Paíño de Madeira**

*Oceanodroma castro* (PB: 3/3, 0/0; C: no se considera)

#### **1997:**

**Alicante.** Denia, en el mar cerca del puerto, 30 de junio (T. Koppejan).

(Atlántico y Pacífico en latitudes tropicales y subtropicales). Observación sorprendente, primera que tiene lugar en el Mediterráneo (Alström *et al.*, 1991). Las dos previamente homologadas en España corresponden a aves capturadas para anillamiento en la costa de Galicia, ambas en julio de 1994 (*Ardeola*, 43: 106). El ejemplar observado se alimentaba junto a la costa en compañía de unos 50 Petreles Europeos *Hydrobates pelagicus* y pudo ser observado a unos



**Paíño de Wilson** (*Oceanites oceanicus*). Frente al cabo de Estaca de Bares, septiembre 1997. Foto: J. Rodríguez Silvar.

100-125 m de distancia (un relato se ha publicado en *Dutch Birding*, 23: 82).

### **Pelícano Común**

*Pelecanus onocrotalus* (PB: 10/12, 1/3; C: 0/0; 0/0)

**Sevilla.** Villafranco del Guadalquivir, finca Veta la Palma, tres ads., hay fotografía, 30 de enero (F. Chiclana Moreno, J. Martín y otros / SEO-Sevilla).

#### **1998:**

**Granada.** Entre Huétor-Tajar y Moraleda de Zafayona, balsa junto a la autopista A92, ad., hay fotografía, 20 de diciembre (N.L.M. Gilissen y A. van der Berg).

(Europa sudoriental, Asia y África). **Origen desconocido.** Por lo que se refiere a la observación sevillana, de acuerdo con los encargados de la finca —en buena parte ocupada por grandes balsas de piscicultura— habría cuatro aves en total y llevarían en la zona varios años. Quizás sean las mismas vistas en septiembre de 1998 en el cercano Estero de Domingo Rubio, Huelva (*Ardeola*, 47: 142).

### **Pelícano Rosado**

*Pelecanus rufescens* (PB: 6/3, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Madrid.** Manzanares el Real, embalse de Santillana, ad., hay fotografías, al menos entre 19 de septiembre y 24 de octubre, quizás hasta mediados de noviembre

(D. López Huertas; J. Gayo D'Iom; F.J. Martínez de Aramayona, J.M. Gefaell y J. Ruiz Rodrigo).

#### **1998:**

**Baleares.** Isla de Mallorca, Salobrar de Campos, el ejemplar señalado en el informe anterior (A. Stagg, *Ardeola*, 47: 143) se vuelve a ver el 7 de diciembre, hay fotografía (M. Rebassa Beltrán, B. Ramis Ripoll y J.R. Sunyer Rullán), y tal vez el mismo individuo en la cercana isla de Cabrera, en el puerto, los días 7 y 8 de diciembre, hay fotografía (B. Galmes).

**Girona.** Castelló d'Empúries, parque natural Aiguamolls de l'Empordà, laguna de La Massona, ad., 20 a 28 de noviembre (M. Gàlvez y S. Sales i Asensio; J. Martí Aledo y C. Ceballos/P.N. Aiguamolls de l'Empordà).

(África al sur del Sáhara). **Origen desconocido.**

### **Avetoro Lentiginoso**

*Botaurus lentiginosus* (PB: 3/3, 0/0; C: 0/0; 0/0)

#### **1961:**

**Girona.** Rosas (Roses), marismas próximas a esta localidad (actualmente Aiguamolls de l'Empordà), ejemplar cazado en el mes de enero y que se conserva naturalizado en una colección particular (la de D. Javier Sala Arago, de Olot), hay fotografía (S. Maluquer Maluquer).

(Norteamérica). Primera cita española e ibérica de esta especie, publicada en *Ardeola*, 9: 136-137, y



**Pelícano Común** (*Pelecanus onocrotalus*). Villafranco del Guadalquivir, Sevilla, enero 1999. Foto: J. Martín.



**Garza Azulada** (*Ardea herodias*), inm.. Embalse de la Cruz Santa, Tenerife, diciembre 1998. Foto: D. Trujillo.

que homologamos basándonos en la foto y notas que figuran en dicha publicación. Con posterioridad se han producido sólo dos registros más, ambos gallegos y de octubre (*Ardeola*, 35: 169 y 47: 143).

#### **Garceta Dimorfa**

*Egretta gularis* (PB: 4/4, 0/0; C: 0/0; 0/0)

#### **1960:**

**Huelva.** Doñana, pajarera, ad. de morfo oscuro en plumaje nupcial, hay fotografías, 2, 3 y 10 de junio (P. Weickert y R. Mertens).

(Paleotropical). Esta observación, ya antigua, se publicó como correspondiente a un ejemplar melánico de Garceta Común *Egretta garzetta* pero, a la vista de la fotografía y las notas que figuran en la publicación (*Ardeola*, 6: 375-376) el Comité de Rarezas la atribuye sin dudas a *Egretta gularis*. Por la estructura del pico, relativamente delicada, podría corresponder a la subespecie nominal. El ejemplar incubaba una puesta de cinco huevos y en el mismo nido, a su lado, se posaba una «garceta común de tipo normal» lo que apunta a un posible emparejamiento interespecífico. El citado artículo indica también que en la misma fecha y localidad se observó en la «pajarera» un probable joven de garceta cuyo

plumaje era en un 50 % gris y en un 50 % blanco, que tanto podría ser un híbrido como un juvenil / primer verano de *E. gularis*. En estos momentos el Comité de Rarezas está completando la revisión de un importante número de citas atribuidas a esta especie.

#### **Garza Azulada**

*Ardea herodias* (PB: 0/0, 0/0; C: 1/1, 0/0)

#### **1998:**

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, Los Realejos, balsa de La Cruz Santa, inm., 5 a 30 de diciembre (D. Trujillo González, C. González González y M. Siverio Hernández).

(América del Norte y Central). Primer registro homologado para las Canarias y España. Para el conjunto de Europa se conocían ya algunos datos para las Azores, de 1968 y 1984 (Snow & Perrins, 1998) y uno para Francia, de 1996 (Dubois *et al.*, 2000). Un artículo acerca de los problemas de identificación que planteó la presente observación, con varias fotografías, puede consultarse en *Birding World*, 12(4): 158-161. Las poblaciones más septentrionales de esta garza americana son migradoras y alcanzan el Caribe y el norte de Suramérica (del Hoyo *et al.*, 1992).

**Marabú Africano***Leptoptilos crumeniferus* (PB: 7/7, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Toledo.** Villasequilla de Yepes, arroyo Cedrón, 23 de septiembre (J. Polo García y J. Rodríguez Parada, comunicado por T. Velasco Tejada).

**1997:**

**Almería.** Vélez Blanco, ad., hay fotografías, 8 de diciembre (J. Motos Oliver y J.M. Motos Oliver).

(África al sur del Sáhara). **Origen desconocido.** El ejemplar de Almería acudía a un comedero de buitres instalado con motivo de un proyecto de reintroducción del Buitre Leonado *Gyps fulvus* (Grupo Naturalista Mahimón).

**Ibis Sagrado***Threskiornis aethiopicus* (PB: 4/5, 1/1; C: 1/1, 0/0)

**Baleares.** Isla de Mallorca, Albufera de Mallorca, ad., 21 de septiembre (P. Vicens i Siquier), al parecer entre el 17 de julio de 1999 y al menos el 16 de marzo de 2001 (J Salvador Aguilar).

(África subsahariana y Madagascar). **Origen desconocido.** Primera observación para Baleares, con visos de origen no natural. La población francesa no deja de crecer y además de en Bretaña ya cuenta con parejas o colonias en los departamentos de Charente-Maritime y Loire-Atlantique (Dubois *et al.*, 2000).

**Espátula Africana***Platalea alba* (PB: 2/2, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Huelva.** Huelva, marismas del Odiel, ad., 1 de enero, al parecer ya desde finales de noviembre (F. Chiclana Moreno y J. Salcedo).

(África al sur del Sahara). **Origen desconocido.** El lugar de observación podría hasta cierto punto sugerir una llegada natural asociada a la migración de la Espátula Común *Platalea leucorodia*, que tiene en las marismas del Odiel una importante colonia de cría.

**Cisne Vulgar***Cygnus olor* (PB: 14/33, 2/5; C: 0/0; 0/0)

**Cádiz.** Sanlúcar de Barrameda, salinas de Monte Algaida, 2º inv./ad., hay fotografías, al menos entre 19 de diciembre de 1999 y 12 de febrero de 2000 (E. Muñoz Charro; F. Chiclana, J.A. Lama, J. Salcedo y J.A. Venegas; D. García González y otros / Universidad de Córdoba).

**Vizcaya.** Guecho (Getxo), ría del Nervión, playa de Ereaga, cuatro, dos ads. y dos inms., 6 de octubre (J. García Astigarraga).

(Europa y Asia, en latitudes medias). **Origen desconocido.**



**Marabú Africano** (*Leptoptilos crumeniferus*). Vélez Blanco, Almería, diciembre 1997. Foto: J. Motos.

**Ánsar Piquicorto**

*Anser brachyrhynchus* (PB: 14/17, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Zamora.** Villafáfila, 1 de diciembre de 1998 (A. Conde San José), y probablemente el mismo individuo los días 5 de enero (J.F. Fernández Baltanás) y 15 de febrero de 1999 (M.A. García Matellanes).

**1998:**

**Zamora.** Villafáfila, véase arriba.  
(Groenlandia, Islandia y Spitsbergen).

**Barnacla Canadiense**

*Branta canadensis* (PB: 5/5, 5/7; C: 0/0; 0/0)

**Cáceres.** Bohonal de Ibor, embalse de Valdecañas, 11 de febrero (J. Briz Lázcoz y E. Climent).

**Navarra.** Laguna de Pitillas, 21 de febrero (C. Almingol Muñoz, L. Almingol Muñoz y otros).

**Zamora.** Villafáfila, tres, muestran caracteres de la subespecie *minima*, 31 de octubre (C. de Dios Ruiz y O. de Dios Ruiz; J.J. Ramos Encalado y otros / SEO-Salamanca); uno, hay fotografía, 30 de noviembre (M.J. Sánchez Rodríguez, J.H. Sánchez y J.A. Corrales); uno, quizás el individuo anterior, 30 de diciembre (T. Sanz, J.A. García, M. Postigo y M.J. Sánchez / Grupo Alauda).

(Norteamérica, introducido en las islas Británicas y Escandinavia). **Origen desconocido.** Buen número de registros esta vez, entre ellos el primero homologado que hace referencia a más de un ave (aunque en diciembre de 1970 se señalaron tres juntas en el embalse de Valdecañas, *Ardeola*, 17-18: 152).

**Barnacla Carinegra**

*Branta bernicla* (PB: 7/25, 3/39; C: 1/1, 0/0)

Aves con caracteres de la subespecie *Branta bernicla hrota*:

**Asturias/Lugo.** Ría del Eo, hasta 31 aves, días 10 (9 ads. y 16 inms.), 17 (15 ads. y 16 inms.) y 24 de septiembre (13 ads. y 16 inms.) (L.J. Salaverri Leiras).

**Lugo.** Ría de Foz, ad., 3 de diciembre de 1998 a 13 de febrero (L.J. Salaverri Leiras y otros); siete, tres ads. y cuatro inms., 17 a 22 de septiembre (con posterioridad, un ad. el 23 de septiembre, dos ads. el 24, un ad. y un inm. el 28, y un inm. del 29 de septiembre al 8 de noviembre) (L.J. Salaverri Leiras).

**1998:**

**Lugo.** Véase arriba.

(Holártico boreal). Notable entrada en Galicia en septiembre de 1999, con 38 aves repartidas entre las rías de Foz y del Eo y más en otros puntos, que no se llegaron a comunicar al Comité de Rarezas.

**Ganso del Nilo**

*Alopochen aegyptiacus* (PB: 5/9, 2/2; C: 0/0; 0/0)

**A Coruña.** Ría de Ortigueira, ensenada de Feás, ad., hay fotografías, 26 de diciembre a 23 de enero de 2000 (A. Gutiérrez Pita, I. Allegue Lagostena, P. Gutiérrez Varga y P. Pita Criado / Sterna-Ferrol).

**Málaga.** Estepona, arroyo Enmedio, hay fotografías, 29 de enero a 7 de febrero (J.R. Butler).

(África subsahariana y Egipto, introducido en Gran Bretaña y los Países Bajos). **Origen desconocido.**

**Tarro Canelo**

*Tadorna ferruginea* (PB: 42/91, 3/7; C: 3/28, 0/0)

**Sevilla.** Marismas del Guadalquivir, Villafranco del Guadalquivir, Entremuros, hay fotografía, 30 de octubre a 3 de noviembre (F. Chiclana Moreno, J.A. Lama Miñana, S. Granados, M. Martín y J. Salcedo).

**Toledo.** Turleque/Mora de Toledo, embalse de Finisterre, cinco, 25 de julio a 26 de septiembre (sólo tres a partir del 25 de agosto) (D.F. Perea, F.J. Ruiz-Tapiador y J. Ruiz-Tapiador). Orgaz, embalse de la Dehesa de Villaverde, 13 a 20 de noviembre (D.F. Perea y F.J. Ruiz-Tapiador).

**Zamora.** Zamora, probable hembra, 7 de marzo (probablemente desde diciembre de 1998, *Ardeola*, 47: 146) (J.J. Ramos Encalado, M. Cuadrado López, G. Hernández Cordero, M.A. García Matellanes y V. López Alcázar).

**1998:**

**Sevilla.** Itálica, ruinas de Itálica, macho y hembra, 30 de mayo (J. Pérez Contreras y G. Delors).

(Asia centro-occidental, con pequeñas áreas en sureste de Europa y noroeste de África). **Origen desconocido.**

**Pato Mandarín**

*Aix galericulata* (PB: 12/30, 2/2; C: 0/0; 0/0)

**A Coruña.** Laxe, laguna de Traba, macho, desde noviembre de 1997 hasta 17 de enero (*Ardeola*, 47: 146) (J.L. Rabuñal Patiño).

**Barcelona.** Delta del Llobregat, marisma de El Remolar, macho en eclipse, 10 de septiembre (F.X. Santaeufemia).

**1997-1998:**

**A Coruña.** Laxe, véase arriba.

(Paleártico oriental, introducido en Gran Bretaña). **Origen desconocido.**

**Silbón Americano**

*Anas americana* (PB: 8/8, 2/4; C: 3/9, 0/0)

**A Coruña.** Ría de Ortigueira, macho ad., hay fotografías, 1 de noviembre de 1998 a 24 de enero (A. Gutiérrez, P. Pita y otros / Sterna-Ferrol).

**Asturias/Lugo.** Ría del Eo, tres: macho ad. entre 23 de diciembre de 1997 y 24 de marzo de 1998; hembra entre 11 de enero y 24 de marzo, y macho de 1er. inv. entre 17 de enero y 24 de marzo (E. García Sánchez y otros / Coordinadora Ornitológica d' Asturias; L.M. Arce; C.M. Álvarez Laó).

**1998:**

**A Coruña.** Véase arriba.

**1997:**

**Asturias/Lugo.** Ría del Eo, macho ad., 18 de enero, 24 de enero y 9 de marzo, según otras fuentes ya desde el 28 de diciembre de 1996 (M.E. Carballal del Valle, D. Álvarez Fernández, J.C. del Campo, E. García Sánchez, J.A. García Fernández, G. Sánchez Jardón y otros / Coordinadora Ornitológica d' Asturias); ría del Eo, macho ad., véase arriba.

(Norteamérica). Ya tenemos trece citas homólogas, la mayoría de Galicia o de Canarias. Sus fechas se extienden desde septiembre hasta abril, si bien dominan las de pleno invierno.

**Cerceta de Alfanjes**

*Anas falcata* (PB: 1/1, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Asturias/Lugo.** Ría del Eo, macho de 1er. inv., 10 de diciembre y según referencias, hasta 18 de diciembre (L.J. Salaverri Leiras).

(Asia oriental). **Origen desconocido.** La única cita previa homologada también es gallega, de Muxía (A Coruña), diciembre de 1992 a mayo de 1993 (*Ardeola*, 41: 106).

**Ánade Sombrío**

*Anas rubripes* (PB: 4/3, 2/2; C: 1/1, 0/0)

**A Coruña.** Ría de Ortigueira, macho ad., 16 de octubre a 19 de diciembre (A. Gutiérrez Pita, P. Gutiérrez Varga, P. Pita Criado e I. Allegue Lagostena / Sterna-Ferrol).

**Lugo.** Ría de Foz, macho, probablemente ad., 13 de diciembre de 1998 a 13 de junio (L.J. Salaverri Leiras).

**1998:**

**Lugo.** Véase arriba.

(Norteamérica). Tercera y cuarta observaciones en Galicia, frente a una cita que contabilizamos en Asturias, otra en Barcelona y otra más en la isla de Tenerife. Pudiera ser que todas las observaciones gallegas correspondieran en realidad a un mismo ejemplar ya que las anteriores tuvieron lugar en las cercanas lagunas de la Terra Chá, Lugo, en diciembre 96-enero 97 y noviembre 97-enero 98.

**Cerceta Aliazul**

*Anas discors* (PB: 19/21, 2/2; C: 4/6, 0/0)

**Álava.** Mendixur, embalse de Ullibarri-Gamboa, macho, 23 a 27 de abril (A. Onrubia Baticón, T. Andrés, H. Garrido, J. Gómez, A. Puente y F. Zufiur), y probablemente el mismo en la cercana laguna de Arkante, Vitoria-Gasteiz, el 18 de junio (G. Belamendía e I. Febrero).

**Pontevedra.** O Grove, laguna de A Bodeira, macho, hay fotografía, 14 de marzo (Sterna-Ferrol).

(Norteamérica). La segunda cita en Galicia y la primera en el País Vasco.

**Porrón Acollarado**

*Aythya collaris* (PB: 10/20, 2/2; C: 21/27, 0/0)

**Asturias.** Gijón (Xixón), parque de Isabel la Católica, macho, hay fotografías, 15 de febrero a 20 de marzo (J.F. Fernández Baltanás; L.M. Arce y V. Sal Sal; J.C. Marín González), al parecer ya desde el 5 de febrero y hasta el 26 de marzo (E. García Sánchez); macho, hay fotografías, 5 a 20 de diciembre (J.C. Marín González), al parecer desde 23 de noviembre hasta 9 de mayo de 2000 (E. García Sánchez).

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, Los Silos, hembra, de 1 de noviembre de 1998 hasta 27 de febrero (K. Emmerson Shirley y otros; cita ya publicada, *Ardeola*, 47: 147). Adeje, embalse de Curbelo, hembra, 10 de noviembre de 1998 a 9 de enero (K. Emmerson Shirley y otros; cita ya publicada, *Ardeola*, 47: 147).

**1998:**

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, Los Realejos, balsa de La Cruz Santa, macho de 1er. inv., 4 a 18 de noviembre (D. Trujillo González y C. González González); Los Silos, balsa de El Polvillo, macho de 1er. inv., 8 y 10 de noviembre (J.J. Ramos, B. Rodríguez Martín, D. Trujillo González y C. González).

**1996-1997:**

**Asturias.** Corvera, embalse de La Furta, y Gozón, embalse de La Granda, hembra, 17 de noviembre de 1996 a 16 de junio de 1997 (M.E. Carballal del Valle, E. García Sánchez y otros / Coordinadora Ornitológica d' Asturias).

**1993:**

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de El Hierro, Frontera, macho de 1er. inv., hay fotografía, 23 y 24 de noviembre (F. Torrents Rodríguez); hembra, hay fotografía, 4 de diciembre de 1992 a 1 de abril de 1993 (F. Torrents Rodríguez, N. Martín y J.J. Quintero).

**1992:**

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de El Hierro, véase arriba.

(Norteamérica). Cuatro citas de 1999 –dos publicadas ya en el informe de 1998- y cinco de años anteriores. Sin duda un buen empujón para una especie que no se señaló en nuestro país hasta 1978.

**Porrón Bola**

*Aythya affinis* (PB: 1/1, 0/0; C: 3/4, 1/8)

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, Arona, Las Galletas, balsa de Roquito del Fraile, ocho, dos machos y seis hembras, 24 de noviembre de 1998 a 15 de marzo (el 7 de enero se cuentan dos machos y tres hembras, además de otra hembra muerta que flota en el agua, y del 3 de febrero al 15 de marzo, dos machos y cuatro hembras) (K. Emmerson Shirley).

**1998:**

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, véase arriba.

(Norteamérica). Interesantísimo caso de invernada en Canarias que, además, afecta a un número excep-



cional de aves. En la misma balsa que todos los registros anteriores de la especie en Canarias.

### Negrón Careto

*Melanitta perspicillata* (PB: 9/10, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Asturias/Lugo.** Ría del Eo, macho de 1er. inv., hay fotografías, 1 de febrero (A. Gutiérrez, P. Gutiérrez, A. López y M. Yáñez / Sterna-Ferrol), al parecer entre 20 de diciembre de 1998 y marzo de 1999 (E. García Sánchez).

(Norteamérica). El primer registro homologado por el Comité Portugués de Raridades tiene que ver con un ave de 1er. año en la isla de S. Jorge, Azores, 9 de octubre de 1997 (Costa *et al.*, 2000).

### Serreta Grande

*Mergus merganser* (PB: 17/48, 2/2; C: 0/0; 0/0)

**A Coruña.** Ría de Ortigueira, hembra / 1er. inv., hay fotografía, 10 de enero (A. Gutiérrez Pita, P. Gutiérrez Varga, M. Pose Picado, V. Rivera Jove y A. López Vázquez / Sterna-Ferrol); hembra / 1er. inv., hay fotografía, 28 de noviembre y 12 de diciembre (A. Gutiérrez Pita, P. Gutiérrez Varga y P. Pita Criado / Sterna-Ferrol).

### 1998:

**A Coruña.** Cariño, macho ad. encontrado muerto (cadáver fresco), hay fotografía, 6 de diciembre (I. Allegue Lagostena, A. Gutiérrez Pita y P. Gutiérrez Varga / Sterna-Ferrol, y otros).

(Paleártico boreal). Observaciones de dos inviernos diferentes. Sumamos ya siete registros en Galicia, seis en Asturias, uno en Cantabria, uno en el País Vasco, uno en Navarra y dos en Cataluña. En Portugal han homologado recientemente su primera observación en este siglo, justo en la frontera gallega: una hembra en el estuario del Miño el 3 de febrero de 1997 (Costa *et al.*, 2000).

### Malvasía Canela

*Oxyura jamaicensis* (PB: 20/41, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Madrid.** Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, hembra, hay fotografías, 27 de noviembre a 31 de diciembre (M. Juan Martínez y D. González Fernández).

### 1985:

**Valencia.** Albufera de Valencia, El Brossar, hembra ad., hay fotografías, cazada en el mes de diciembre, se conserva en el museo de la «Societat Cultural Parc Natural de l'Albufera» en El Palmar (J.I. Dies Jambrino).



**Serreta Grande** (*Mergus merganser*), hembra o 1er. inv. Ortigueira, A Coruña, enero 1999. Foto: STERNA-Ferrol.

(América, introducida en Gran Bretaña). La observación valenciana es una de las más antiguas que se conocen en España, junto con una de Navarra de noviembre del mismo año, 1985, y otra no homologada de un ave que se cazó en el delta del Ebro en el invierno anterior.

### Buitre Moteado

*Gyps rueppellii* (PB: 24/11, 0/0; C: 0/0; 0/0)

#### 1998:

**Cádiz.** Área del Estrecho (Tarifa-Algeciras), al menos cinco individuos, dos subads. y tres inms.: junto al puesto de observación de El Algarrobo, Algeciras, dos inms. en una carroña el 6 de septiembre y uno al día siguiente (G. Doval), así como un inm. en vuelo el 8 de septiembre (K. Tucker); valle de El Santuario, Tarifa, dos inms. en vuelo, diferentes al anterior, 9 de septiembre (K. Tucker y otros); observatorio de Canteras, Tarifa, inm. el 24 de septiembre (A. Onrubia y T. Andrés); El Algarrobo, inm. en vuelo el 26 de septiembre (A. Onrubia y otros); observatorio de La Hoya, Tarifa, inm. en vuelo el 30 de septiembre (N. Jankowski, C. Ruiz y F. Zufiur); junto a la carretera entre Tarifa y Algeciras, kilómetro 99, subad. el 3 de octubre (G. van Duin); en carroña en el valle de El Santuario, al menos tres aves -un inm., un aparente subad. y uno casi ad.- el 6 de octubre, hay fotografías, y un inm. el 8 de octubre (G. Doval); en una nue-

va carroña en el mismo punto, dos inms. el 15 de octubre (G. Doval y M. López Parra).

#### 1997:

**Cádiz.** Área del Estrecho (Tarifa-Algeciras), al menos tres individuos diferentes, todos inms.: uno en carroña junto al observatorio de La Hoya, Tarifa, 25 de agosto, hay fotografías (G. Doval, J.C. Lorenzo, R. Vaquero y J.L. Vélez); uno en vuelo desde el observatorio de Cazalla, Tarifa, 27 de agosto (M. Lobón y J. Pinilla); uno en carroña entre los observatorios de Cazalla y Tarifa-Tráfico, 5 de octubre (G. Doval); uno en carroña junto a Facinas, 24 de octubre y posiblemente el mismo el 28 de octubre (G. Doval, L. Barrios); uno en el vertedero de basuras de Los Barrios, 3 de noviembre (G. Doval); uno posado en el valle de El Santuario, Tarifa, 8 de noviembre (G. Doval); uno posado cerca del hotel Dos Mares, Tarifa, y dos -sin duda diferentes al anterior que se vio apenas hora y cuarto antes- en el vertedero de Los Barrios, 9 de noviembre (G. Doval); uno en carroña en el valle de El Santuario, 10 de diciembre (G. Doval).

(África subsahariana). Observaciones del mayor interés, debidas a Guillermo Doval y otros participantes en el proyecto Migres de SEO/BirdLife sobre migración de aves planeadoras en el Estrecho. Al tener que ver con un cierto número de aves -al menos tres en 1997 y cinco en 1998- y coincidir en el tiempo con los pasos del Buitre Leonado *Gyps fulvus*, sugie-



**Buitre Moteado** (*Gyps rueppellii*), subad. Tarifa, Cádiz, octubre 1998. Foto: G. Doval.



**Águila Moteada** (*Aquila clanga*), juv. Doñana, Huelva, febrero 1999. Foto: A. Cortizo.

ren decididamente la posibilidad de aves llegadas de forma natural (véase *La Garcilla*, 106: 29-31).

#### **Águila Moteada**

*Aquila clanga* (PB: 9/9, 3/3; C: 0/0; 0/0)

**A Coruña.** Boiro, junto a la playa de Carragueiros, 2º/3er. año calendario, 12 de octubre (I. Fernández Otero).

**Cádiz.** Algeciras, observatorio de El Algarrobo, ad./subad., 5 de octubre (C. Noivo y M. Narvaez).

**Huelva.** Parque Nacional de Doñana, La Rocina, juv., hay fotografías, 24 de febrero (A. Cortizo Amaro).

(Eurasia septentrional, desde Polonia al este de Siberia). Destaca la observación de A Coruña, por apartarse mucho de las zonas del este y el sur de la Península donde hasta ahora se había citado la especie.

#### **Focha Americana**

*Fulica americana* (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Guipúzcoa.** Irún, bahía de Txingudi, Plaiaundi, 1er. inv., hay fotografía, 15 a 30 de noviembre (D. Calleja Marcos, G. Gorospe Rombouts, J. Belzunce, F.

Calvo, J.M. Devesa, M. Etxaniz, H.A. González Arcelús, M. Guereñu y E. Narzabal).

(América). Un breve artículo sobre la presente observación aparece en *La Garcilla*, 109. Se trata de la primera cita española y la segunda ibérica después de la de Ludo, Algarve, septiembre de 1992 (*Ardeola*, 41: 108). La Focha Americana cría desde el Cánada hasta el norte de Sudamérica y sus poblaciones más norteñas son migradoras, con cuarteles de invernada que llegan hasta Centroamérica. En Europa es un divagante extremadamente raro, con otros registros solamente en Islandia (dos), Feroes (uno), Irlanda (uno) e Inglaterra (dos) (Cottridge & Vinicombe, 1996; Mitchell & Young, 1997; Rogers *et al.*, 2000).

#### **Chorlitejo Semipalmado**

*Charadrius semipalmatus* (PB: 2/2, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**A Coruña.** Laxe, laguna de Traba, juv., 4 y 10 de septiembre (J.L. Rabuñal Patiño).

(Norteamérica). Las dos citas anteriores corresponden al mismo observador que en la presente, José Luis Rabuñal, y tuvieron lugar en la cercana ensenada de la Insua en julio de 1988 y mayo-agosto de

1990. En el conjunto del Paleártico occidental tan sólo se conocen para la especie, además de éstas, unas pocas observaciones en las Azores, de las cuales seis homologadas (Costa *et al.*, 2000), y una en Gran Bretaña (Cottridge & Vinicombe, 1996).

### **Chorlito Dorado Americano**

*Pluvialis dominica* (PB: 10/10, 1/1; C: 9/9, 0/0)

**A Coruña.** Embalse de Cecebre, ad., 9 y 10 de septiembre (C. de Dios Ruiz, O. de Dios Ruiz y J.M. Andrés Alonso).

#### **1998:**

**Pontevedra.** Baiona, cabo Silleiro, juv., hay fotografía, 13 y 20 de octubre (C. Vidal Rodríguez, A. Lomeña Rodríguez, R. Salvadores Ramos y otros).

(Norteamérica septentrional). En la región peninsular –Galicia– y el período del año –septiembre/octubre– que acumulan más registros.

### **Chorlito Dorado Siberiano**

*Pluvialis fulva* (PB: 2/2, 2/2; C: 0/0; 0/0)

**Pontevedra.** Marismas de Umia-O Grove, ensenada de O Bao, 9 de septiembre (L. Carrera Buergo).

**Valencia.** Albufera de Valencia, *tancat* de La Ratlla, ad., hay fotografías, 26 y 27 de agosto (B. Dies Jambrino y J.I. Dies Jambrino).

(Siberia). Citas muy próximas en el tiempo –no tanto en el espacio– que son tercera y cuarta de las homologadas en España. Las anteriores corresponden a Málaga, agosto de 1980, y el delta del Ebro, marzo de 1996, lo que indica un predominio de datos mediterráneos acorde con el origen asiático de la especie. En Francia acaban de homologar su quinto registro (Frémont *et al.*, 2000).

### **Chorlito Dorado Americano / Siberiano**

*Pluvialis dominica / fulva* (PB: 5/5, 1/1, C: 2/2, 1/1)

**A Coruña.** Ribeira, marisma de Carregal, 1er. inv., 14 de noviembre (M.A. Conde Teira y C. Luciarde Pérez).

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, San Miguel, Amarilla Golf, ad., 8 de septiembre (K. Emmerson Shirley).

(Norteamérica/Siberia).

### **Avefría Sociable**

*Vanellus gregarius* (PB: 13/13, 1/1; C: 1/1, 0/0)

**Lleida.** El Pla d'Urgell, El Poal, hay fotografías, 25 de febrero (F. Moncasí i Salvia).

#### **1994:**

**Toledo.** Villaseca de la Sagra, hay fotografías, 11 de octubre (T. Velasco Tejada y P. Molina Holgado); Lillo, laguna de La Albardiosa, 29 de octubre (T. Velasco Tejada).

(Sureste de Rusia y Asia centro-occidental). Las citas homologadas hasta ahora se reparten geográficamente entre Cataluña (cinco), Castilla-La Mancha

(cuatro), Aragón (tres), Andalucía, Baleares y Canarias, y en el calendario entre los períodos octubre-diciembre (seis) y febrero-marzo (nueve).

### **Correlimos de Alaska**

*Calidris mauri* (PB: 1/1, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**A Coruña.** Laxe, laguna de Traba, ad., 20 y 23 de septiembre (J.L. Rabuñal Patiño).

(Alaska y noreste de Siberia). Es una pena no poder publicar aquí las descripciones de José Luis Rabuñal, verdaderamente magistrales. La única cita previa que teníamos de esta especie también es suya, de la ensenada de la Insua, 8 de septiembre de 1979 (*Ardeola*, 39: 78). La especie es uno de los *Calidris* americanos menos frecuentes en Europa, con registros únicamente en Gran Bretaña (seis), Irlanda, Suecia, Francia (cuatro) y España (Mitchell & Young, 1997; Frémont *et al.*, 1999).

### **Correlimos Menudillo**

*Calidris minutilla* (PB: 2/2, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**A Coruña.** Malpica de Bergantiños, playa de Seiruga, juv., 6, 7 y 8 de octubre (J.L. Rabuñal Patiño).

(Norteamérica septentrional). Tercera cita, las anteriores en la ensenada de la Insua, octubre de 1987, y el delta del Ebro, agosto de 1996 (*Ardeola*, 37: 117; 46: 137). Cinco homologadas llevan hasta el momento en Francia (Frémont *et al.*, 2000).

### **Correlimos Pectoral**

*Calidris melanotos* (PB: 79/88, 9/9; C: 12/12, 2/2)

**A Coruña.** Laxe, laguna de Traba, juv., 29 de agosto (I. Fernández Otero); ad., 8, 9 y 10 de septiembre (J.L. Rabuñal Patiño). Arteixo, embalse de Sabón, 12 de septiembre (C. de Dios Ruiz, O. de Dios Ruiz y J.M. Andrés Alonso).

**Baleares.** Isla de Mallorca, parque natural de S'Albufera, juv., 16 a 20 de septiembre (J. Yates; G. Heurl).

**Barcelona.** Delta del Llobregat, marisma de Les Filipines, juv., 27 de septiembre (X. Larruy, D. Burgas, R. Gutiérrez, F. López, A. Ramal y J. Tizón).

**Cádiz.** Jerez de la Frontera, laguna de Medina, juv., 15 de octubre (J.L. Muddeman).

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, San Miguel, Amarilla Golf, dos, juvs. diferentes, uno el 5 de octubre y otro el 19 de octubre (al parecer, días antes coincidieron los dos) (K. Emmerson Shirley).

**Valencia.** Albufera de Valencia, *tancat* de La Ratlla, juv., 13 y 14 de septiembre (B. Dies Jambrino y J.I. Dies Jambrino).

#### **1998:**

**Guipúzcoa.** Irún, bahía de Txingudi, Plaiaundi, dos juvs., 13 de octubre (D. Calleja Marcos, M. Guereñu Clemente y M. Etxaniz Aginagalde).

(Norteamérica). Otro buen año...

**Correlimos Canelo**

*Tryngites subruficollis* (PB: 16/17, 1/1; C: 4/4, 0/0)

**A Coruña.** Embalse de Cecebre, hay fotografía, 9 y 10 de septiembre (C. de Dios Ruiz, O. de Dios Ruiz y J.M. Andrés Alonso).  
(Norteamérica).

**Archibebe Patigualdo Chico**

*Tringa flavipes* (PB: 22/22, 2/2; C: 3/3, 0/0)

**Cáceres.** Cáceres, embalse del Salor, probable ad., 8 de agosto (A. Mogená Peral).

**Vizcaya.** Ría de Guernica (Gernika), San Cristóbal, juv., 10 de septiembre (I. García Serna).

**1998:**

**Málaga.** Málaga, desembocadura del Guadalhorce, 1er. inv., hay fotografía, 30 de octubre a 7 de diciembre (A. Tamayo Guerrero, A.M. Pérez Ortigosa, J. Fregenal Díaz, A. Rodríguez Mariscal y otros).

**Valencia.** Albufera de Valencia, saladar del Racó de l'Olla, juv., 6 y 7 de septiembre (J.I. Dies Jambriño y B. Dies Jambriño).

(Norteamérica). Cuatro citas que incluyen las primeras conocidas para el País Vasco y Extremadura.

**Andarriós del Terek**

*Xenus cinereus* (PB: 21/22, 2/2; C: 1/1, 0/0)

**Cádiz.** San Fernando, marismas, caño de Sancti-Petri, 7 de enero (J.M. Muñoz Andrades, B. Ramírez Aleu y V. Santamaría Calvario).

**Girona.** Aiguamolls de l'Empordà, laguna de El Cortalet, 16 de mayo (F. Thomas y D. Tábara).

(Siberia, Rusia europea y parte de Finlandia). Es interesante la fecha de Cádiz, plenamente invernal.

**Andarriós Maculado**

*Actitis macularia* (PB: 5/5, 0/0; C: 4/5, 1/1)

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, Arona, Las Galletas, costa, probable 1er. verano, hay fotografía, 12 de abril (E. García del Rey).

**1998:**

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de La Gomera, San Sebastián de La Gomera, dos, juvs./1er. inv., 20 de noviembre (A. Buchheim).

**1997:**

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, Arona, Las Galletas, charca de El Fraile, 1er. inv., 22 de septiembre a 12 de octubre (M.B. Lancaster) y 2 de



**Archibebe Patigualdo Chico** (*Tringa flavipes*), 1er. inv. Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, diciembre 1998. Foto: A. Rodríguez Mariscal.

noviembre (D. Trujillo González), según otras fuentes, en la misma charca desde 3 de septiembre hasta 25 de febrero de 1998 y en la cercana costa de Las Galletas el 22 de marzo de 1998 (J.A. Lorenzo Gutiérrez y *Birding World*, 11: 92-93).

(Norteamérica). La cita de 1997, Tenerife, supone el primer caso de invernada que se documenta en Canarias.

### Falaropo Tricolor

*Phalaropus tricolor* (PB: 7/7, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Álava.** Vitoria-Gasteiz, humedales de Salburúa, balsa de Zurbano, hembra, 19 de mayo (L. Lobo Urrutia / Centro de Estudios Ambientales).

### 1998:

**Huelva.** Huelva, marismas del Odiel, macho, 23 de mayo (R. Tomé, A.C. Cardoso, M. Shepherd y J.P. Tavares).

(Norteamérica). No teníamos observaciones desde 1989. La del País Vasco, primera para esta comunidad autónoma, se produjo en unas interesantes lagunas recientemente recuperadas, inmediatas a Vitoria.

### Gaviota Guanaguana

*Larus atricilla* (PB: 15/15, 2/1; C: 1/1, 0/0 )

**Barcelona.** Malgrat de Mar, desembocadura del Tordera, ad., 11 de enero (X. Larruy Brusi).

**Girona.** Blanes, playa, ad., hay fotografías, el mismo individuo que en Malgrat de Mar (Barcelona), al menos de 23 de enero a 18 de febrero (F. López, J. Castelló y F. Macià; R. Gutiérrez y H. Arbonés; X. Larruy Brusi y A. Vázquez).

(Norteamérica). Hay, pendiente de homologación, un registro del invierno anterior para la misma zona. Y ya van cinco en Cataluña...

### Gaviota de Delaware

*Larus delawarensis* (PB: 78/144, 1/1; C: 9/11, 0/0)

**A Coruña.** Arteixo, playa Alba, ad. inv., 18 de septiembre (Ignacio Fernández Otero).

### 1998:

**A Coruña.** Valdoviño, A Frouxeira, 1er. inv., hay fotografías, 12 y 21 de noviembre (A. Gutiérrez Pita, P. Gutiérrez Varga y P. Pita Criado / Sterna-Ferrol).

**Asturias.** Castropol, puerto, ad., 11 a 21 de enero (E. García Sánchez). Gijón (Xixón), parque de Isabel la Católica, 2º inv. a 2º verano, 11 y 13 de abril (J.C. Marín González).

**Las Palmas.** Isla de Fuerteventura, La Oliva, Punta del Bajo, 2º inv., 30 de noviembre (M. Greenhalgh).

### 1997:

**Asturias.** Castropol, puerto, ad., 25 de noviembre de 1996 a 2 de febrero (E. García Sánchez).

### 1996:

**Asturias.** Castropol, puerto, ad., véase arriba (E. García Sánchez).

### 1990:

**Asturias.** Castropol, puerto, ad., 14 de enero, hay fotografía (J.A. Diego García y J.A. García Fernández / Coordinadora Ornitológica d'Asturies) y muy probablemente el mismo ejemplar del 6 al 31 de diciembre (L.A. Álvarez Usategui / Coordinadora Ornitológica d'Asturies).

(Norteamérica). En el puerto asturiano de Castropol, varias citas de un adulto que se viene observando desde enero de 1990 y para el que ya teníamos observaciones homologadas de enero de 1993, enero de 1994, enero de 1995 y diciembre de 1995-marzo de 1996 (*Ardeola*, 42: 107, 43: 112, 44: 131 y 45: 108). Al tratarse casi con plena seguridad de un mismo ejemplar, modificamos en consecuencia las cifras totales de individuos observados, tan sólo orientativas ya que es muy probable que estas mismas circunstancias –aves que repiten invernada– se dan en muchos registros.

### Gaviota Groenlandesa

*Larus glaucooides* (PB: 17/17, 0/0; C: 0/0; 0/0)

### 1998:

**A Coruña.** Carballo, Baldaio, 1er. inv., 7 de noviembre (X. Varela Varela).

**Pontevedra.** Moaña, Domaio, 1er. inv., hay fotografía, 19 y 27 de enero (I. Fernández Otero).

### 1997:

**Asturias.** Gijón (Xixón), embalse de San Andrés, 1er. inv. en muda, 25 de febrero a 10 de mayo (M.E. Carballal del Valle, C.M. Álvarez Laó y X. Gayol García).

(Noreste del Canadá y Groenlandia). Más citas invernales en el norte.

### Gavión Hiperbóreo

*Larus hyperboreus* (PB: 65/77, 3/3; C: 0/0, 1/1).

**A Coruña.** Ribeira, O Touro, 2º verano, 29 y 30 de marzo, al parecer desde una semana antes (M.A. Conde Teira, M. Lustres Fernández y A. Pena Lustres).

**Cádiz.** Cádiz, astilleros, probable 2º inv. en muda, 6 de marzo (F. Chiclana Moreno, F.J. Romero y J. Salcedo).

**Guipúzcoa.** Hondarribia, costa del monte Jaizkibel, 1er. inv., 23 de enero (M. Etxaniz Aginagalde).

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, Puerto de la Cruz, muelle pesquero, 4º verano/ad., hay fotografías, 5 de marzo (S. Brehme).

### 1998:

**Ceuta.** Ceuta, 2º inv., 4 y 5 de febrero (D. Berral Huertas).

### 1997:

**Asturias.** Gijón (Xixón), embalse de San Andrés, 1er. inv., 6 de febrero (M.E. Carballal del Valle).

(Holártico circumpolar). A destacar aquí, por ser muy meridionales, las primeras observaciones para Ceuta y las islas Canarias. Para Marruecos se cono-

cen 13 registros de esta especie, todos en la costa atlántica (Bergier *et al.*, 1997).

### Tórtola Senegalesa

*Streptopelia senegalensis* (PB: 3/3, 2/2; C: 6/5, 2/2)

**Baleares.** Isla de Mallorca, Palma de Mallorca, Son Roqueta, ad., hay fotografía, 23 de agosto de 1998 y desde mayo de 1999 hasta, por lo menos, 18 de noviembre (J. Muntaner Yangüela).

**Las Palmas.** Isla de Fuerteventura, Morro Jable, proximidades del hotel «Stella Canaris», dos, 25 de enero (C.-J. Palacios); Costa Calma, una, 5 de marzo (E. Douglas, R.G. Nisbet, C.-J. Palacios y otros); La Lajita, proximidades del zoo, una, 17 de abril (C.-J. Palacios).

**Madrid.** Collado Villalba, urbanización Dominio de Fuentenebro, 14 de abril a 10 de mayo (J.A. Malo de Molina y P. Solano Sanz).

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, Buenavista del Norte, La Malecita, hay fotografía, 8 a 16 de enero (B. Rodríguez Martín).

#### 1998:

**Baleares.** Isla de Mallorca, ciudad de Palma, véase arriba.

**Las Palmas.** Isla de Fuerteventura, Morro Jable, proximidades del hotel «Stella Canaris», un ave el 30 de noviembre (C.-J. Palacios) y tres el 10 de diciembre (C.-J. Palacios y T. Clarke) (véase *Ardeola*, 47: 150). (África y suroeste de Asia). **Origen desconocido.**

Los ejemplares de Palma de Mallorca y Madrid, aquerenciados a zonas ajardinadas y cantando numerosos días... En Canarias, nuevas observaciones en Fuerteventura, que sumadas a las del informe anterior totalizan como mínimo seis aves diferentes, además de la primera en Tenerife.

### Vencejo Moro

*Apus affinis* (PB: 15/26, 0/0; C: 5/6, 0/0)

#### 1998:

**Las Palmas.** Isla de Fuerteventura, Pájara, Morro Jable, dos, 23 de noviembre (M. Greenhalgh e Y. Greenhalgh).

(África, Oriente Medio y sur de Asia).

### Abejaruco Papirrojo

*Merops persicus* (PB: 2/2, 1/2; C: 0/0; 0/0)

**Málaga.** Mijas, río Fuengirola, dos, 26 de abril, y parece que tres el 22 de abril (S. Solís Gómez, M.C. Reina Guerra, A. Serrano Lavado y A. Tamayo Guerrero).

(África, Oriente Medio, India y Paquistán). Tercera cita homologada (las anteriores en el delta del Llobregat, Barcelona, junio de 1989, y Zaragoza, abril de 1997).

### Bisbita de Richard

*Anthus richardi* (PB: 42/139, 1/2; C: 2/2, 0/0)

**A Coruña.** Laxe, laguna de Traba, dos (quizás tres), ad. y 1er. inv., 5 de diciembre de 1998 a 17 de abril, sólo uno desde el 1 de abril (J.L. Rabuñal Patiño).

#### 1998:

**A Coruña.** Laxe, laguna de Traba, véase arriba.

(Centro y este de Asia). Es el quinto invierno consecutivo en que se detectan en Traba. Para Portugal hay una revisión en Moore & Elias (1997).

### Lavandera Cetrina

*Motacilla citreola* (PB: 12/12, 0/0; C: 0/0; 0/0)

#### 1987:

**Barcelona.** Delta del Llobregat, marisma de Les Filipines, 1er. inv., 12 de septiembre (D. González Ballvey).

(Ucrania, Rusia oriental y Asia). Se llevan nueve citas en Cataluña, dos en Baleares y una en Galicia. En Portugal se homologó hace poco la segunda, un macho ad. en el estuario de Arade, Faro, el 24 de marzo de 1997 (Costa *et al.*, 2000).

### Bulbul Naranjero

*Pycnonotus barbatus* (PB: 1/1, 0/0; C: 0/0; 0/0)

#### 1956:

**Málaga.** Málaga, grupo de eucaliptos a unos 10 km de la ciudad en la carretera a Torremolinos, ejemplar visto los días 13, 14 y 16 de noviembre (H. Hinricsson).

(África). **Origen desconocido.** Este registro, aparecido en *Ardeola*, 5: 224-226, es el único que registra la bibliografía española reciente. Parece fuera de duda, a la vista de lo que consigna dicha publicación, la correcta identificación del ave. Sin embargo, la llegada a España podría haber sido no natural pese a la proximidad entre la localidad de observación y las costas africanas donde comienza el área de distribución de la especie, ya que se trata de una especie muy sedentaria y de la que no se conocen otras presentaciones en Europa (Snow & Perrins, 1998). Al Bulbul Naranjero le corresponde, por tanto, la categoría D en la lista española.

### Robín Americano

*Turdus migratorius* (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Vizcaya.** Laukiniz, hembra o 1er. inv., 10 a 15 de diciembre (I. García Serna).

(Norteamérica). Primera cita para España y la península Ibérica. Este vistoso zorzal americano, parecido a nuestro Mirlo Común *Turdus merula* en cuanto a nicho ecológico y costumbres, aparece en Europa como divagante relativamente raro. Mitchell & Young (1997) recogen 50 citas que se reparten entre las islas Británicas (30), Alemania (10), Islandia, Noruega, Suecia, Bélgica, Austria y la república Checa, con una mayoría en otoño-invierno.

### Mosquitero Bilstado

*Phylloscopus inornatus* (PB: 18/18, 3/3; C: 5/5, 0/0)

**Baleares.** Isla de Menorca, Ferrerías, Cala Galdana, 29 de octubre (G.J. Todd).

**Huelva.** Parque Nacional de Doñana, Manecorro, ad., capturado para anillamiento, hay fotografías, 1 de noviembre (J.L. Arroyo Matos, R. Bamford, B. Scaar, J. Szabo y otros).

**Málaga.** Alfarnatejo, río Sabar, capturado para anillamiento, hay fotografías, 23 de octubre (R.A. Haro Ramos y otros).

**1996:**

**Barcelona.** Delta del Llobregat, junto a la laguna de El Remolar, 27 de octubre (D. González Ballvey y A. Sánchez Floro).

(Norte y este de Siberia y Asia central). Tres datos este otoño... pero nada menos que 41 en Francia (Frémont *et al.*, 2000).

**Papamoscas Papirojo**

*Ficedula parva* (PB: 13/13, 3/3; C: 1/1, 0/0)

**Baleares.** Isla de Cabrera, 1er. inv., atrapado para anillamiento, hay fotografía, 13 de octubre (R. Escandell y J.M. González Mulet). Isla de Mallorca, Pollensa (Pollença), valle de Bóquer, hembra/1er. inv., 15 de octubre (A.J. Swann).

**Huelva.** Parque Nacional de Doñana, Manecorro, hembra ad., atrapada para anillamiento, hay fotografías, 1 de octubre (J.L. Arroyo Matos, J.M. Colino Merino, B. Fuertes Marcos, A. Magnani y otros).

**1998:**

**Alicante.** Elche, dunas de Pinet, hembra/1er. inv., 8 de septiembre (I. Gámez Carmona).

(Europa central y oriental, y Asia). El mejor año hasta el momento.

**Papamoscas Collarino**

*Ficedula albicollis* (PB: 23/23, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Baleares.** Pollensa (Pollença), Puerto Pollensa, macho, 21 de abril (K. Wood).

(Europa central y oriental y partes de Turquía, el Cáucaso e Irán). Nada original en esta cita: un macho, en abril y en las Baleares...

**Alcaudón Isabel**

*Lanius isabellinus* (PB: 2/2, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Almería.** Roquetas de Mar, salinas, hay fotografías, 10 de noviembre (A. Edwards, J. Parish y otros) y 12 de noviembre (F. Ávila Vico y J. Remacha Lorenzo).

(Asia). Tercera observación en España, habiendo tenido lugar las anteriores en Mallorca, septiembre de 1994, y Galicia, septiembre de 1997 (*Ardeola*, 47: 156).

**Estornino Rosado**

*Sturnus roseus* (PB: 5/5, 1/1; C: 1/1, 0/0)

**Asturias.** Llanes, juv., 15 y 29 de septiembre (L. Carrera Buergo).



**Alcaudón Isabel** (*Lanius isabellinus*). Roquetas de Mar, Almería, noviembre 1998. Foto: J. Remacha.





**Escribano Pigmeo** (*Emberiza pusilla*). Alhaurín de la Torre, Málaga, noviembre 1999. Foto: A.M. Pérez Ortigosa.

(Sureste de Europa y suroeste de Asia). Tenemos aún muy pocos registros por comparación a otros países del oeste de Europa, como Francia (46 homologados hasta 1999, Frémont *et al.*, 2000), Holanda (48 hasta 1996, van den Berg & Bosman, 1999) y sobre todo las Islas Británicas (456 hasta 1995, Cottridge & Vinicombe, 1996).

#### **Escribano Pigmeo**

*Emberiza pusilla* (PB: 17/17, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Málaga.** Alhaurín de la Torre, 1er. inv., capturado para anillamiento, hay fotografías, 20 de noviembre (A.M. Pérez Ortigosa y otros / SEO-Málaga). (Nordeste de Europa y Siberia).

#### **Escribano Cabecinegro**

*Emberiza melanocephala* (PB: 8/8, 1/1; C: 0/0; 0/0)

**Sevilla.** Marismas del Guadalquivir, Brazo del Este, macho, 16 de mayo (J. Groenning y B.O. Hoeyland).

#### **1994:**

**Barcelona.** Sant Just Desvern, camino de Can Fatjó, macho, hay fotografías, 14 de junio (C. Furquet Morales, enviado por S. Sales i Asensio).

(Italia, sureste de Europa y Asia hasta el Irán).

En el año de este informe se ha comprobado por vez primera la reproducción de la especie en Francia, concretamente en el extremo sureste, en los Alpes Marítimos (Dupuy & Dupuy, 2000).

#### 2) ESPECIES CONSIDERADAS SÓLO PARA LAS ISLAS CANARIAS

(Con comentarios de Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez)

#### **Avetoro Común**

*Botaurus stellaris* (1/1, 1/1)

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, Tejina, balsa de riego, hay fotografía, 12 a 16 de abril (E. García del Rey).

(Eurasia y puntos de África). La primera observación homologada también fue primaveral, de marzo (*Ardeola*, 47:156).

#### **Barnacla Cariblanca**

*Branta leucopsis* (0/0, 1/1)

**Las Palmas.** Isla de Gran Canaria, Agüimes, Arinaga, hay fotografía, noviembre (O. Trujillo).

(Groenlandia, Spitsbergen, Nueva Zembla y puntos de Escandinavia). **Origen desconocido.** Aunque podría tratarse de un escape, no es descartable una llegada natural. En este sentido, se ha citado también en Marruecos y las Azores (Snow & Perrins, 1998).

### Tarro Blanco

*Tadorna tadorna* (0/0, 1/2)

**Las Palmas.** Isla de Gran Canaria, embalse de Chamoriscán, San Bartolomé de Tirajana, dos, 27 de enero (R. Vernon).

(Europa y Asia). Primer registro que homologamos, de una especie que también ha alcanzado de forma ocasional los archipiélagos de Azores y Madeira (Snow & Perrins, 1998).

### Porrón Bastardo

*Aythya marila* (1/1, 1/1)

**Las Palmas.** Isla de Fuerteventura, embalse de Los Molinos, macho, hay fotografías, 29 de noviembre de 1998 a 19 de marzo (C.-J. Palacios y otros; E. García del Rey; F. López Sanz).

#### 1998:

**Las Palmas.** Isla de Fuerteventura, embalse de Los Molinos, hembra ad., 25 de octubre a 11 de noviembre (C.-J. Palacios); macho, véase arriba.

(Holártico, boreal). Primeras citas homologadas, aunque hay algunas previas que el Comité de Rarezas estudiará en breve. Reflejan llegada invernal, sobre todo de hembras y juveniles.

### Águila-azor Perdicera

*Hieraaetus fasciatus* (0/0, 2/2)

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de El Hierro, El Golfo, ad., 3 y 18 de marzo (A. Vittery); 2º año calendario, 6 de marzo (A. Vittery).

(Berbería y sur de Europa y de Asia). **Origen desconocido.** Interesantes primeras citas para el conjunto del archipiélago, curiosamente en la isla más occidental del mismo.

### Gaviota Cabecinegra

*Larus melanocephalus* (2/3, 0/0)

#### 1998:

**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, puerto, dos aves de 1er. inv., 20 de diciembre, y una sola los días 23 y 24 de diciembre (J. Alonso Alonso).

(Europa, Turquía y el Cáucaso). Del mismo modo que la anterior cita homologada (*Ardeola*, 47: 156), inmaduros en fechas invernales.

### Gaviota de Audouin

*Larus audouinii* (1/1, 0/0)

#### 1998:

**Las Palmas.** Isla de Fuerteventura, Antigua, Salinas del Carmen, 2º inv., 20 de noviembre (M. Grehenthalgh).

(Mediterráneo). Primera observación, aunque el Comité de Rarezas tiene constancia de la existencia de algunas otras que espera poder estudiar. Esta gaviota inverna abundante en las vecinas aguas de Marruecos, Mauritania y Senegal (del Hoyo *et al.*, 1996; Snow & Perrins, 1998) y sin embargo, no llega a Canarias con la frecuencia que cabría esperar.

### Charrán Ártico

*Sterna paradisaea* (1/1, 1/8)

**Las Palmas.** Isla de Fuerteventura, Pájara, playa de Sotavento de Jandía, ocho ads., 2 de marzo (C.-J. Palacios)

(Holártico circumpolar). De nuevo en fecha pre-nupcial, aunque esta vez en mayor número y formando parte de un gran bando junto con Charrán Común *Sterna hirundo* y Charrán Patinegro *S. sandvicensis*.

#### REGISTROS NO HOMOLOGADOS

**1960: Bisbita de Richard** *Anthus richardi*; Tarifa (Cádiz), 12 de abril (cita publicada en *Ardeola*, 6: 391-392, con una descripción que se juzga insuficiente).

**1992: Correlimos Pectoral** *Calidris melanotos*; Frontera, isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), dos, ad. y juv., 12 a 24 de septiembre, y un ad., 3 a 5 de noviembre (no hay descripción escrita, tan sólo un dibujo no muy preciso).

**1996: Chorlito Dorado Americano** *Pluvialis dominica*; Añoover de Tajo (Toledo), 8 de junio (descripción insuficiente).

**1997: Zampullín Cuellirrojo** *Podiceps auritus*; embalse de Ullibarrí-Gamboa, Mendixur (Álava), 5 a 14 de septiembre (descripción insuficiente). **Pardela Chica** *Puffinus assimilis*; punta de La Vaca, Gozón (Asturias), dos, 7 de septiembre (descripción basada en bibliografía y que incluye rasgos, como la coloración de las patas, que no pueden apreciarse a la distancia de 500 m a que se dice que se efectuó la observación). **Halcón Sacre** *Falco cherrug*; Pollensa (Pollença), valle de Bóquer, 6 de septiembre (la descripción, un tanto superficial, presenta rasgos que no concuerdan con *Falco cherrug* y por el contrario, apuntan la posibilidad de un joven de Halcón Peregrino *Falco peregrinus*). **Gaviota Groenlandesa** *Larus glaucooides*; vertedero de la Vall d'en Joan, Gavà (Barcelona), 25 de octubre a 1 de noviembre (la descripción apunta a una gaviota *Larus cachinnans / fuscus* con plumaje leucístico). **Carricero Políglota** *Acrocephalus palustris*; Aranjuez (Madrid), capturado para anillamiento, 25 de julio (aunque los datos biométricos podrían corresponder a esta especie, en

la descripción del plumaje faltan datos importantes de cara a separarla con absoluta seguridad del Carricero Común *Acrocephalus scirpaceus*).

**1998: Zampullín Cuellirrojo** *Podiceps auritus*; embalse de Ullibarri-Gamboa, Mendixur (Álava), 27 y 29 de agosto (descripción insuficiente). **Pardela Chica** *Puffinus assimilis*; punta de La Vaca, Gozón (Asturias), ocho, 23 de agosto (las mismas razones que en la observación de 1997, véase arriba). **Pelicano Común** *Pelecanus onocrotalus*; tres, embalses de Castejón (Toledo), 19 de noviembre y, en el relativamente próximo embalse de Valdecañas, 21 de noviembre (descripción insuficiente). **Garceta Nívea** *Egretta thula*; balsa de Valle Molina, Tegueste, isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), noviembre, hay fotografía (la foto muestra un ave del año de Garceta Común *Egretta garzetta*). **Garceta Dimorfa** *Egretta gularis*; salinas de Santa Pola (Alicante), inm. de morfo blanco, 8 de septiembre (la descripción puede corresponder a un joven de Garceta Común *Egretta garzetta*). **Tarro Canelo** *Tadorna ferruginea*; Villafáfila (Zamora), hembra ad., 14 de marzo (descripción insuficiente). **Busardo Moro** *Buteo rufinus*; embalse de Cúber, Pollensa (Pollença), isla de Mallorca (Balears), 28 de abril (descripción insuficiente). **Halcón Sacre** *Falco cherrug*; playas entre urbanización Guadalmar y Parador del Golf, Málaga (Málaga), probable ad., 21 y 22 de septiembre (algunos rasgos sugieren un híbrido de los empleados en cetrería). **Agachadiza Real** *Gallinago media*; ría de Villaviciosa (Asturias), 26 de noviembre (descripción poco convincente, de un ave observada brevemente en vuelo). **Cáрабо Común** *Strix aluco*; Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura (Las Palmas), 22 de octubre (descripción insuficiente). **Collalba Desértica** *Oenanthe deserti*; Maspalomas, isla de Gran Canaria (Las Palmas), 28 de diciembre (descripción insuficiente). **Mosquitero Musical** *Phylloscopus trochilus yakutensis*; Racó de l'Olla, Albufera de Valencia (Valencia), hay fotografías, 18 a 23 de noviembre (ni las fotos ni la descripción del ave, que no pudo ser estudiada en mano, permiten descartar otras posibilidades empezando por *P. trochilus acredula*, muy difícil de separar de *yakutensis*).

**1999: Tarro Canelo** *Tadorna ferruginea*; embalse de Santillana, Manzanares el Real (Madrid), dos, 18 de junio (información insuficiente). **Aguilucho Papialbo** *Circus macrourus*; Aiguamolls de l'Empordà (Girona), macho, hay fotografías, 4 de marzo (las fotos, de pobre calidad, se ajustan mejor a un Aguilucho Pálido *Circus cyaneus*). **Busardo Moro** *Buteo rufinus*; Aracena (Huelva), ad., 3 de septiembre (descripción insuficiente para eliminar la posibilidad de un Busardo Ratoneo de la subespecie *Buteo buteo vulpinus*). **Halcón Borní** *Falco biarmicus*; Tarifa (Cádiz), 3 de septiembre (información insuficiente). **Correlimos Pectoral** *Calidris melanotos*; Aiguamolls de l'Empordà (Girona), 6 de agosto (descripción insuficiente). **Agachadiza Real** *Gallinago*

*media*; ría de Villaviciosa (Asturias), 22 de enero (mismos comentarios que en la observación de 1998). **Zarapito Fino** *Numenius tenuirostris*; Aiguamolls de l'Empordà, juv., hay fotografía, 6 de agosto (ni la descripción ni la fotografía permiten descartar otros *Numenius*). **Archibebe Patigualdo Grande** *Tringa melanoleuca*; ría de Villaviciosa (Asturias), 22 de enero (descripción excesivamente «bibliográfica» y fecha invernal insólita). **Vencejo Moro** *Apus affinis*; Jubrique (Málaga), grupo de seis a ocho individuos, 20 de septiembre (información insuficiente). **Bisbita de Richard** *Anthus richardi*; Roquetas de Mar (Almería), ad., hay fotografía, 3 de enero (descripción imprecisa y foto de poca calidad que parece corresponder a un Bisbita Alpino *Anthus spinoletta*). **Collalba Desértica** *Oenanthe deserti*; salinas de Cerrillos, Roquetas de Mar (Almería), 27 de octubre (observación muy breve y descripción insuficiente). **Carricero Políglota** *Acrocephalus palustris*; Delta del Llobregat (Barcelona), hay fotografías, 15 de mayo (las fotografías corresponden con seguridad a un Carricero Común *Acrocephalus scirpaceus*). **Mosquitero Musical** *Phylloscopus trochilus yakutensis*; Villanueva de Algaidas (Málaga), capturado para anillamiento, hay fotografías, 18 de septiembre (el plumaje coincide con el de la subespecie propuesta, pero por la coloración de las patas, no enteramente negra, podría tratarse de un individuo muy pálido de *P. trochilus trochilus* o *P. trochilus acredula*).

#### RECONSIDERACIÓN DE REGISTROS DE ANTERIORES INFORMES

**1984: Petrel de Bulwer** *Bulweria bulwerii*; frente a la desembocadura del Tordera, entre Malgrat de Mar (Barcelona) y Blanes (Girona), al menos dos y quizás hasta catorce, 29 de abril (cita publicada en el primer informe del Comité de Rarezas, *Ardeola*, 32: 139, y en *Dutch Birding*, 7: 20-27). La observación se efectuó a considerable distancia (750 a 1.500 m) y la descripción, poco detallada, no ofrece suficiente garantía. Algunos de los rasgos que señala (como alas bastante obtusas, vuelo que recuerda al de un gavián, ausencia de planeos...) no sólo se apartan de la especie propuesta sino que sugieren la posibilidad de chatacabras *Caprimulgus* spp. en migración sobre el mar (en la actualidad se sabe que este es un fenómeno relativamente habitual en la zona durante la primavera). La cita era la única homologada hasta la fecha para España peninsular, si bien existen varias para Portugal.

#### BIBLIOGRAFÍA

ALLSTRÖM, P., COLSTON, P. & LEWINGTON, I. 1991. *A Field Guide to the Rare Birds of Britain and Europe*. HarperCollins Publishers. London.

- BERGIER, P., FRANCHIMONT, J., THEVENOT, M. et la Commission d'Homologation Marocaine. 1997. Les Oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine Numéro 2 (1996). *Porphyrio*, 9: 165-173.
- COSTA, H., BOLTON, M., CATRY, P., MATIAS, R., MOORE, C.C. & TOMÉ, R. 2000. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 1997 y 1998. *Pardela*, 9: 3-27.
- COTTRIDGE, D.M. & VINICOMBE, K. 1996. *Rare Birds in Britain and Ireland. A Photographic Record*. HarperCollins Publishers. London.
- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. & SARGATAL, J. (eds.) 1992. *Handbook of the birds of the world*, vol. 1. Lynx Edicions. Barcelona.
- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. & SARGATAL, J. (eds.) 1996. *Handbook of the birds of the world*, vol. 3. Lynx Edicions. Barcelona.
- DUBOIS, P.J., LE MARÉCHAL, P., OLIOSO, G. & YÉ-SOU, P. 2000. *Inventaire des oiseaux de France*. Nathan. Paris.
- DUPUY, D. & DUPUY, J.-L. 2000. Premier cas de nidification du Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* en France (Alpes-Maritimes). *Ornithos*, 7: 174-179.
- FRÉMONT, J.-Y. et le CHN. 1999. Les oiseaux rares en France en 1998. *Ornithos*, 6: 145-172.
- FEÉMONT, J.-Y. et le CHN. 2000. Les oiseaux rares en France en 1999. *Ornithos*, 7: 146-173.
- MITCHELL, D. & YOUNG, S. 1997. *Photographic Handbook of the Birds of Britain and Europe*. New Holland. London.
- MOORE, C.C. & ELIAS, G. 1997. Sobre a ocorrência invernal de Petinha-dos-campos *Anthus campestris* e de Petinha de Richard *Anthus novaeseelandiae* em Portugal. *Airo*, 8: 44-47.
- ROGERS, M.J. and the Rarities Committee. 2000. Report on rare birds in Great Britain in 1999. *British Birds*, 93: 512-567.
- SNOW, D.W. & PERRINS, C.M. (eds.) 1998. *The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition*. Oxford University Press. Oxford.
- VAN DEN BERG, A.B. & BOSMAN, C.A.W. 1999. *Rare birds of the Netherlands*. Pica Press, Mountfield (Reino Unido).